

Adatbázisok elmélete 14. előadás

Csima Judit
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számítástudományi Tsz.
I. B. 136/b
csima@cs.bme.hu

2003. Április 1.

ADATBÁZISOK ELMÉLETE 14. ELŐADÁS

- *Beszúrási anomália*: Nem tudunk beszúrni adatot, ha az egyik attribútum hiányzik, mert nem ismerjük (és nem lehet NULL).
- *Törlési anomália*: Csak egész sorok törölhetők, így elveszhetnek hasznos adatok. Pl. ha egy termelő épp nem termel semmit, kitöröljük a címét is.

A relációk, tárolás jósága attól függ, hogy milyen megkötések vannak az adatokon.

Megszorítások két osztálya:

- *Értékfüggő*: Pl. $\text{ÁR} \geq 0$, ÉLETKOR egész ≤ 1000 , NÉV karaktersor, $\text{CÍM} \neq \text{NULL}$, (típusleírások)
- *Értékfüggetlen*: TERMÉKNÉV , TERMELŐ kulcs; $\forall \text{TERMELŐ}$ -nek egy címe van, egy TERMELŐ azonos nevű termékéből csak egy árú van

Utóbbi: az attribútumok mennyire függenek egymástól \implies **funkcionális függőség**

2

ADATBÁZISOK ELMÉLETE 14. ELŐADÁS

Relációs sémák tervezése

Van elméleti alap \implies érv a relációs technika mellett
(Objektumosnak nincs ilyen.)

Kérdés:

- Mik a jó relációk?
- Milyen relációkat érdemes tárolni?
- Hogyan alakíthatunk tetszőleges relációkat jókká?

Cél: El akarunk kerülni kellemetlen jelenségeket, **anomáliákat**:

- *Módosítási anomália*: pl. ha a Termék(Termelő, Cím, Terméknév, Ár) reláció esetén egy termelő címe több sorban is előfordul, változaskor mindenhol át kell írni. Hiba esetén inkonzisztencia.

1

ADATBÁZISOK ELMÉLETE 14. ELŐADÁS

Funkcionális függőségek

Jelölés: $R(A_1, \dots, A_n)$ reláció, X attribútum halmaz $\implies X \subseteq R$
 $X = \{A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}\}$ helyett $X = A_{i_1}A_{i_2} \dots A_{i_k}$

Definíció. $Y \subseteq R$ **funkcionálisan függ** $X \subseteq R$ -től, (jelölés: $X \rightarrow Y$), ha R bármely két sorára igaz, hogy ha ők megegyeznek X -en, akkor Y -on is megegyeznek.

Pl. $X = \text{TERMELŐ}$, $Y = \text{ÁR}$ $\implies X \rightarrow Y$

Megjegyzések:

- Azok az érdekes összefüggések, amik minden ilyen attribútumokkal rendelkező táblában fenn kell, hogy álljanak: axiómaszerű feltételek, az adatbázis bármely változása esetén is fennállnak \implies *érdemi függés*
Azok, amik csak véletlenül, csak egy pillanatban állnak fenn \implies *eseti függés*, (ezek nem érdekelnek, például lehetséges hogy egy adott pillanatban minden ár csak egyszer szerepel és ekkor úgy tűnik, mintha $\text{ÁR} \rightarrow \text{Termék}$ érvényes függés lenne)

3

- Tehát az érdemi függések megadása modellezési kérdés: a séma megadásakor döntjük el, hogy milyen függéseket akarunk fenntartani mindenáron.

Ezentúl a relációs sémának része lesz a függőségek halmaza F is $\implies (R, F)$

Vagyis megadjuk, hogy mik a séma attribútumai és mik az érdemi függései.

PI.

TERMELŐ, TERMÉKNÉV \rightarrow TERMELŐ, TERMÉKNÉV, ÁR, CÍM

TERMELŐ \rightarrow CÍM

S(NÉV, CÍM, VÁROS, IRÁNYÍT ÓSZ, TELEFON)

CÍM, VÁROS \rightarrow IRÁNYÍT ÓSZ

IRÁNYÍT ÓSZ \rightarrow VÁROS

NÉV, CÍM, VÁROS \rightarrow TELEFON

- Egy adott reláció adott állapotából nem következik semmilyen érdemi függés. Viszont látszódhat olyan, hogy mi nem függhet mitől.
- $X \rightarrow Y$ teljesülhet úgy is, hogy az adott relációban nincs is két olyan sor, amik X -en megegyeznek.

Logikai következmény

Kérdés: ha adott egy F függéshalmaz és egy reláció, amiben F függései igazak, akkor milyen további függések lesznek még biztosan igazak?

Például: ha HALLGATÓ, TÁRGY \rightarrow GYAKORLAT és GYAKORLAT \rightarrow GYAKVEZ, akkor HALLGATÓ, TÁRGY \rightarrow GYAKVEZ.

Azaz általánosabban: ha $XY \rightarrow Z$ és $Z \rightarrow W$, akkor attól függetlenül, hogy mi a reláció és X, Y, Z, W , igaz lesz, hogy $XY \rightarrow W$.

Definíció. Adott (R, F) . Az $X \rightarrow Y$ függés **logikai következménye** (szemantikai következménye) F -nek, ha az $X \rightarrow Y$ minden olyan r relációban teljesül, ahol F függései mind teljesülnek.

Jelölése: $F \models X \rightarrow Y$

Azaz ez a fogalom azt adja meg, hogy mely függéseknek kell szükségszerűen

- X -nek és Y -nak nem kell diszjunktaknak lenniük

A séma megadása csak a keretet jelenti, beleértve a függéseket is, ha ezt feltöltjük adatokkal, akkor kapunk egy a sémára illeszkedő relációt. A r reláció akkor illeszkedik az (R, F) sémára ha az attribútumai az R -ben adottak és teljesülnek benne az F függések.

teljesülniük minden olyan sémában/relációban, ahol F függései fennállnak.

Hogyan lehetne ezeket meghatározni, illetve eldönteni, hogy egy függés ilyen-e?

Felvesszünk axiómákat, és azok segítségével próbáljuk levezetni. Persze ehhez az kell, hogy pontosan azokat lehessen levezetni F -ből, akik logikai következményei neki.

Levezethetőség jele: $F \vdash X \rightarrow Y$

Tehát bevezetünk axiómákat, levezethetőséget és belátjuk, hogy $\models \iff \vdash$.

(Pl. logikában így van.)

$\models \Rightarrow \vdash$: *Teljességi tétel*, ami igaz az levezethető.

$\vdash \Rightarrow \models$: *Igazság tétel*, csak igaz dolgok vezethetők le.

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függőség akkor vezethető le egy adott F függéshalmazból, ha az axiómák ismételt alkalmazásával F -ből megkapjuk $X \rightarrow Y$ -t. Jele: $F \vdash X \rightarrow Y$.

Armstrong-axiómák

- Reflexivitás: Ha $X, Y \subseteq R$ és $Y \subseteq X$, akkor $X \rightarrow Y$.
- Kiegészítési tulajdonság: Ha $X, Y \subseteq R$ és $X \rightarrow Y$, akkor $XW \rightarrow YW$ igaz tetszőleges $W \subseteq R$ -re.

3. Tranzitivitás: Ha $X, Y, Z \subseteq R$, $X \rightarrow Y$ és $Y \rightarrow Z$, akkor $X \rightarrow Z$.

Bizonyítás: (Igazság tétel)

Azt kell belátni, hogy ha egy függés (esetleg több lépésben) levezethető F -ből a három axióma segítségével, akkor ez a függés logikai következménye is F -nek, azaz minden olyan relációban, ahol F minden függése teljesül, ott teljesül a levezetett függés is. Ehhez elég azt belátni, hogy külön-külön, az egyes axiómák egyszeri használata ilyen függést ad.

1. Azt kell belátni, hogy minden r relációban, minden $Y \subseteq X \subseteq R$ attribútumhalmaz esetén $X \rightarrow Y$ igaz, azaz ha r bármely két adott sora megegyezik X -en, akkor megegyeznek Y -on is. De mivel $Y \subseteq X$, ezért nyilván megegyeznek Y -on, ha X -en megegyeztek. ✓
2. Az kell, hogy ha egy R -re illeszkedő r relációban $X \rightarrow Y$ igaz, akkor $XW \rightarrow YW$ is igaz lesz. Vegyünk két sort r -ben, ami megegyezik XW -n. Ekkor ezek megegyeznek X -en és W -n is, külön-külön. Mivel $X \rightarrow Y$, így megegyeznek Y -n is, tehát YW -n is. ✓

- i) $X \rightarrow Y$: ez F -beli
- ii) $XZ \rightarrow YZ$: kiegészítve Z -val
- iii) $X \rightarrow Z$: ez F -beli
- iv) $X \rightarrow XZ$: kiegészítve X -vel
- v) $X \rightarrow YZ$: iv) és ii) + tranzitivitás

Állítás (Áltranszitiv szabály). $\{X \rightarrow Y, YW \rightarrow Z\} \vdash XW \rightarrow Z$

Bizonyítás:

- i) $X \rightarrow Y$: ez F -beli
- ii) $XW \rightarrow YW$: kiegészítve W -val
- iii) $YW \rightarrow Z$: ez F -beli
- iv) $XW \rightarrow Z$: ii) és iii) + tranzitivitás

Állítás (Felbontási szabály). Tegyük fel, hogy $Z \subseteq Y$, ekkor $\{X \rightarrow Y\} \vdash X \rightarrow Z$

Bizonyítás:

- i) $X \rightarrow Y$: ez F -beli
- ii) $Y \rightarrow Z$: reflexivitás
- iii) $X \rightarrow Z$: i) és ii) + tranzitivitás

3. Az kell, hogy ha egy R -re illeszkedő r relációban $X \rightarrow Y$ és $Y \rightarrow Z$ igaz, akkor $X \rightarrow Z$ is igaz lesz. Vegyünk két sort, ami megegyezik X -en. Mivel $X \rightarrow Y$, megegyeznek Y -n is. De mivel $Y \rightarrow Z$, megegyeznek Z -n is. ✓

Példa

Állítás. Ha $R(\text{Város, Utca, Irányítószám})$ és $F = \{VU \rightarrow I, I \rightarrow V\}$, akkor $F \vdash IU \rightarrow VIU$ (és mivel $\vdash \Rightarrow \models$ -t már láttuk, ezért $F \models IU \rightarrow VIU$).

Bizonyítás:

- i) $I \rightarrow V$: ez F -beli
- ii) $IU \rightarrow VU$: kiegészítve U -val
- iii) $IU \rightarrow IVU$: kiegészítve I -vel

Néhány további szabály, ami levezethető az axiómákból (és az igazságtétel miatt igazak is).

Állítás (Unió szabály). $\{X \rightarrow Y, X \rightarrow Z\} \vdash X \rightarrow YZ$

Bizonyítás:

Lezárás

Definíció. Ha F egy függéshalmaz, akkor a **lezártja** F^+ az F -ből levezethető összes függés:

$$F^+ = \{X \rightarrow Y \mid F \vdash X \rightarrow Y\}$$

Jó: mert ha majd belátjuk $\vdash \Leftrightarrow \models$ -t, akkor kiderül, hogy ez éppen az F -ből szükségszerűen következő összes függést adja meg.

Gond: nagyon nagy lehet

Pl. $R(A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_n)$ és $F = \{A_i \rightarrow B_j \mid 1 \leq i, j \leq n\}$, akkor ez n^2 db függés F^+ -ban benne van minden $A_{i_1} \dots A_{i_k} \rightarrow B_{j_1} \dots B_{j_l}$, azaz $(2^n - 1)(2^n - 1) \approx 2^{2n}$ eleme van.

Ezért ehelyett valami mást nézünk, amit könnyebb lesz meghatározni és jól közelíti F^+ -t:

Definíció. Ha X egy attribútum halmaz (R, F) -ben, akkor **lezártja**

$$X^+(F) = \{A \in R \mid F \vdash X \rightarrow A\},$$

azaz azon attribútumok, amik függnek X -től.

Állítás. $X \subseteq X^+(F) \subseteq R$

Lemma. (Fontos!!!) $F \vdash X \rightarrow Y \iff Y \subseteq X^+(F)$

Bizonyítás: \implies : Tegyük fel, hogy $F \vdash X \rightarrow Y$ és legyen $A \in Y$.

$F \vdash X \rightarrow A$, hiszen vegyük $X \rightarrow Y$ levezetését és alkalmazzuk a felbontási szabályt a végén.

Definíció szerint ekkor $A \in X^+(F)$. Ez minden $A \in Y$ -ra igaz. \checkmark

\impliedby : Legyen $Y = A_1 \dots A_k \subseteq X^+(F)$.

gy definíció szerint $\forall A_i \in Y$ -ra $F \vdash X \rightarrow A_i$.

Ekkor $X \rightarrow Y$ levezetése: vesszük az A_i -k levezetését és a végén alkalmazzuk az unió szabályt $k - 1$ -szer. \checkmark

Következménye: Ha minden X -re ismerjük/ki tudjuk számítani $X^+(F)$ -et, akkor tetszőleges $X \rightarrow Y$ függésről eldönthető, hogy F^+ -beli-e vagy sem, mert $X \rightarrow Y \in F^+$ pontosan akkor teljesül (definíció szerint), ha $F \vdash X \rightarrow Y$, de ez meg az előbbi lemma szerint pontosan akkor van, ha $Y \subseteq X^+(F)$

Megjegyzés: Majd látjuk, hogy $X^+(F)$ kiszámolására lesz gyors algoritmus.