

Algel VIII. gyakorlat

Hash!

2011. március 28.

3. A $T[0 : M - 1]$ táblában rekordokat tárolunk nyitott címzésű hashelt szervezéssel. Az ütközések feloldására lineáris próbát alkalmazunk. Tegyük fel, hogy a tábla használata során egy hibás törlés történt: egy cellából kitöröltünk egy rekordot a törlés-bit beállítása nélkül.

(a) **Igaz-e, hogy a hibás törlés helye mindig megtalálható?**

Nem, pl egy elem volt a táblában, és azt töröltük.

(b) **Adjunk hatékony (lineáris) algoritmust a tábla megjavítására! (Módosítsuk a táblát úgy, hogy megszűnjenek a hibás törlés negatív következményei!)**

Akkor okozhat ez problémát, ha az utolsó üres hely mondjuk i , de egy i -nél kisebb pozíciójú x elemre $h(x) \geq i$. Ha ilyen helyzet nincs, akkor jó a tábla. Arra kell gondolni, hogy a táblán végighaladva mindig az utolsó üres hely érdekel minket. Induljunk el a végéről, és minden elemre számoljuk ki $h(x)$ -et, és nézzük meg, hogy a nyilvántartott utolsó üresről vagy arról túlról származik-e. Ha igen, akkor máshol nem lehetett hibás törlés, hiszen ha mégsem ott lett volna, akkor a törlés előtt is rossz lett volna a tábla. Bökkük be az utolsó üresen a törlés-bitet! A tábla jó lesz, hiszen helyes törlés után is így nézne ki a tábla. Egy végigolvasásból megvoltunk, tehát lineáris az algoritmus.

5. [ZH: 2005. április 8.] Egy m méretű hash-táblában már van néhány elem. Adjon $O(m)$ lépésszámú algoritmust, amely meghatározza, hogy egy újabb elem lineáris próbával történő beszúrásakor maximum hány ütközés történhet.

Nyilván akkor történik a legtöbb ütközés, ha a (ciklikus értelemben) leghosszabb folytonosan kitöltött rész legvégére próbáljuk beszúrni az új elemet. Így elindulunk a tömb elejéről, az első üres sorozat végéig elmegyünk (a ciklikusság miatt célszerű így), ez $O(n)$, utána amíg kitöltött sorozatot találunk, egy számláló értékét növeljük. Ha üres jön, akkor a számláló értékét eltároljuk (feltéve, hogy nagyobb az eddig eltároltnál), majd nullázzuk. Ha körbeértünk, akkor vége. Ez még egy végigolvasás, tehát $O(n) + O(n) = O(n)$ lépésből megvan az egész.

6. **Mi a baja a $h(k) = k^2 \pmod{7}$ hash-függvénynek, ha a tábla 7 méretű?**

Nem az összes lehetséges értéket veszi fel. Ki kell számolni mind a 7 lehetőséget, és látszik.

7. **Mutassuk meg, hogy nyitott címzéses hashelés és lineáris próba esetén már két kulcshoz tartozó hash-függvényérték megegyezése is okozhat tetszőlegesen nagy méretű csomósodást!**

Konstruktívan: legyen $h(x_1) = h(x_2)$, ezután $h(x_i) = h(x_{i-1}) - 1$. Így csak x_1 -hez és x_2 -höz tartozó érték egyezik meg, mégis látható, hogy tetszőlegesen nagy n -re n hosszú csomónk lesz (és minden beszúrás ütközéses volt).

8. [ZH: 2010. április 19.] Egy M méretű hash-táblába $n < M$ elemet raktunk be nyitott címzéssel, kvadratikus próbával, a $h(x)$ hash-függvényt használva. Ennek során t_1 ütközés történt (ennyiszert kellett tovább próbálkoznunk, egy elem beszúrása során több ütközés is lehetett). Ugyanezt az n elemet ugyanabban a sorrendben beszúrtuk egy M^2 méretű hash-táblába is, de most lineáris próbával, $M \cdot h(x) + 1$ hash-függvénnyel, ekkor t_2 ütközés történt. **Igazolja, hogy $t_2 \leq t_1$.**

Vegyük észre, hogy mivel az eredeti táblában a méretkorlát miatt legfeljebb M elemet tároltunk, valamint az új hash-függvény minden eredeti hash-értéket M távolságra helyez egymástól, így az új táblában a különböző hash-értékű elemek nem ütközhetnek lineáris próba esetén (ehhez legalább $M + 1$ eddigi ütközés kellett volna). Így ütközés csak azért adódhat a második esetben, mert az ütköző elemek hash-értéke megegyezik. Ezekben az esetekben viszont ugyanezek

az ütközések megtörténtek az eredeti táblában is (a próbasorozatok értékfüggetlensége miatt). Tehát legalább annyi ütközés volt az első, mint a második esetben.

9. **[Vizsga: 2008. június 3.] Az 1 és 91 közötti összes 3-mal osztható egész számot valamilyen sorrendben egy M méretű hash-táblába raktuk a $h(x) = x \pmod{M}$ hash-függvény segítségével, lineáris próbával. Ennek során hány ütközés fordulhatott elő, ha $M = 35$, illetve ha $M = 36$?**

$M = 35$ esetén a $3 \dots 33$ számok a saját helyükre kerülnek, $0 \pmod{3}$ helyekre, $36 \dots 69$ számok $1 \pmod{3}$ helyekre, $72 \dots 90$ számok pedig $2 \pmod{3}$ helyekre, és mindegyik elfér, tehát nincs ütközés. $M = 36$ -nál csak $3 \dots 33$ fér be ütközés nélkül, $36 \dots 69$ pont ugyanezekre a helyekre menne, $72 \dots 90$ szintén. Innen már ki lehet számolni.

10. **[Vizsga: 2005. május 26.] A kezdetben üres M méretű hash-táblába sorban beraktuk a k_1, k_2, \dots, k_n kulcsokat a $h(x) \equiv x \pmod{M}$ hash-függvénnyel, lineáris próbával. Jelölje t_1 a keletkezett táblában az egymás melletti foglalt mezők maximális számát. Amikor ugyanezt a k_1, k_2, \dots, k_n sorozatot ugyanabban a sorrendben egy üres $2M$ méretű táblába rakjuk be a $h(x) \equiv x \pmod{2M}$ hash-függvénnyel, lineáris próbával, akkor a kapott táblában legyen t_2 az egymás melletti foglalt mezők maximális száma.**

- (a) **Igazolja, hogy $t_2 \leq t_1$**

Tfh $t_2 > t_1$. Ekkor vegyünk egy t_2 hosszú sorozatot a $2M$ méretű táblában, és nézzük meg, hogy ezek hogyan helyezkednének el az eredeti táblában (a beszúrások sorrendje megegyezik!). Vegyük észre, hogy az eredetibe beszúrásakor, ha egyéb ütközés nem volt, ugyanezt a sorozatot kapjuk (ciklikus értelemben, modulo aritmetika miatt), vagy esetleg hosszabbat is (lineáris próba miatt). Ez ellentmond a feltételnek, tehát $t_2 \leq t_1$.

- (b) **Igaz-e, hogy $t_1 \leq 2t_2$?**

Ellenpélda: $|0|4|2| \pmod{3}$, de $|0| |2| |4| \pmod{6}$, $t_1 = 3$, $t_2 = 1$, és $3 \not\leq 2 \cdot 1$.