

# A számítástudomány alapjai

Mátrixműveletek és lineáris leképezések

2022. november 22.

## Mátrixműveletek vektorműveletekből

Vektorokon értelmeztük az összeadást és a skalárral szorzást. Az oszlopokat egymás alá írva bármely  $n \times k$  méretű mátrixot értelmezhetünk  $n \cdot k$  magasságú oszlopvektorként is. Ezzel értelmezni tudjuk az **azonos méretű** mátrixokon az összeadást és a skalárral szorzást.

**Példa:** 
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 6 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

$$7 \cdot \begin{pmatrix} 6 & 0 & 6 \\ 1 & 606 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 & 0 & 42 \\ 7 & 4242 & 77 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ nem értelmes.}$$

## Mátrixműveletek vektorműveletekből

Vektorokon értelmeztük az összeadást és a skalárral szorzást. Az oszlopokat egymás alá írva bármely  $n \times k$  méretű mátrixot értelmezhetünk  $n \cdot k$  magasságú oszlopvektorként is. Ezzel értelmezni tudjuk az **azonos méretű** mátrixokon az összeadást és a skalárral szorzást.

## Mátrixműveletek vektorműveletekből

Vektorokon értelmeztük az összeadást és a skalárral szorzást. Az oszlopokat egymás alá írva bármely  $n \times k$  méretű mátrixot értelmezhetünk  $n \cdot k$  magasságú oszlopvektorként is. Ezzel értelmezni tudjuk az **azonos méretű** mátrixokon az összeadást és a skalárral szorzást.

**Megf:** Ha  $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times k}$  és  $\lambda, \kappa \in \mathbb{R}$ , akkor (1)  $A + B = B + A$ ,  
(2)  $(A + B) + C = A + (B + C)$ , (3)  $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ ,  
(4)  $(\lambda + \kappa)A = \lambda A + \kappa A$ , (5)  $\lambda(\kappa A) = (\lambda \kappa)A$ , továbbá  
(6)  $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$ , (7)  $\lambda \cdot A^\top = (\lambda A)^\top$ .

## Mátrixműveletek vektorműveletekből

Vektorokon értelmeztük az összeadást és a skalárral szorzást. Az oszlopokat egymás alá írva bármely  $n \times k$  méretű mátrixot értelmezhetünk  $n \cdot k$  magasságú oszlopvektorként is. Ezzel értelmezni tudjuk az **azonos méretű** mátrixokon az összeadást és a skalárral szorzást.

**Megf:** Ha  $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times k}$  és  $\lambda, \kappa \in \mathbb{R}$ , akkor (1)  $A + B = B + A$ ,  
(2)  $(A + B) + C = A + (B + C)$ , (3)  $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ ,  
(4)  $(\lambda + \kappa)A = \lambda A + \kappa A$ , (5)  $\lambda(\kappa A) = (\lambda\kappa)A$ , továbbá  
(6)  $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$ , (7)  $\lambda \cdot A^\top = (\lambda A)^\top$ .

Vektorok egymással történő összeszorozását nem értelmeztük eddig. Most fogjuk, de bizonyos korlátokkal. Ehhez először azonos méretű vektorokat tanulunk meg összeszorozni.

## A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

# A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill.

(1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u},$

(3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v}).$

# A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén (1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$ ,

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill. (3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v})$ .

**Megj:** (1) Világos, hogy ha  $\underline{u} = \underline{0}$  vagy  $\underline{v} = \underline{0}$ , akkor  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ , ám a fordított következtetés nem igaz, pl  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ .



## A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén (1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$ ,

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill. (3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v})$ .

**Megj:** (1) Világos, hogy ha  $\underline{u} = \underline{0}$  vagy  $\underline{v} = \underline{0}$ , akkor  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ , ám a fordított következtetés nem igaz, pl  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ .

(2) A skaláris szorzás segítségével értelmezhető a vektorhossz és a merőlegesség (akár magasabb dimenzióban is).

## A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén (1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$ ,

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill. (3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v})$ .

**Megj:** (1) Világos, hogy ha  $\underline{u} = \underline{0}$  vagy  $\underline{v} = \underline{0}$ , akkor  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ , ám a fordított következtetés nem igaz, pl  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ .

(2) A skaláris szorzás segítségével értelmezhető a vektorhossz és a merőlegesség (akár magasabb dimenzióban is).

**Megf:** A  $\underline{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  vektor hossza az  $a, b, c$  oldalakkal rendelkező téglatest testátlójának hossza, ami a Pitagorasz-tétel alapján

$$\|\underline{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

## A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén (1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$ ,

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill. (3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v})$ .

**Megj:** (1) Világos, hogy ha  $\underline{u} = \underline{0}$  vagy  $\underline{v} = \underline{0}$ , akkor  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ , ám a fordított következtetés nem igaz, pl  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ .

(2) A skaláris szorzás segítségével értelmezhető a vektorhossz és a merőlegesség (akár magasabb dimenzióban is).

**Megf:** A  $\underline{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  vektor hossza az  $a, b, c$  oldalakkal rendelkező téglatest testátlójának hossza, ami a Pitagorasz-tétel alapján  $\|\underline{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ . Ugyanez, másképp felírva:  $\|\underline{v}\|^2 = \underline{v} \cdot \underline{v}$ .

## A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén (1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$ ,

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill. (3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v})$ .

**Megj:** (1) Világos, hogy ha  $\underline{u} = \underline{0}$  vagy  $\underline{v} = \underline{0}$ , akkor  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ , ám a fordított következtetés nem igaz, pl  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ .

(2) A skaláris szorzás segítségével értelmezhető a vektorhossz és a merőlegesség (akár magasabb dimenzióban is).

**Megf:** A  $\underline{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  vektor hossza az  $a, b, c$  oldalakkal rendelkező téglatest testátlójának hossza, ami a Pitagorasz-tétel alapján

$$\|\underline{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}. \quad \text{Ugyanez, másképp felírva: } \|\underline{v}\|^2 = \underline{v} \cdot \underline{v}.$$

**Megj:** Az  $\underline{u}$  és  $\underline{v}$  vektorok merőlegessége azt jelenti, hogy

$$\|\underline{u}\|^2 + \|\underline{v}\|^2 = \|\underline{u} - \underline{v}\|^2$$

## A skaláris szorzás

**Def:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok **skaláris szorzata**

$$\underline{u} \cdot \underline{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n.$$

**Megf:**  $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{w} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén (1)  $\underline{u} \cdot \underline{v} = \underline{v} \cdot \underline{u}$ ,

(2)  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$  ill. (3)  $(\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \lambda(\underline{u} \cdot \underline{v})$ .

**Megj:** (1) Világos, hogy ha  $\underline{u} = \underline{0}$  vagy  $\underline{v} = \underline{0}$ , akkor  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$ , ám a fordított következtetés nem igaz, pl  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ .

(2) A skaláris szorzás segítségével értelmezhető a vektorhossz és a merőlegesség (akár magasabb dimenzióban is).

**Megf:** A  $\underline{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  vektor hossza az  $a, b, c$  oldalakkal rendelkező téglatest testátlójának hossza, ami a Pitagorasz-tétel alapján

$$\|\underline{v}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}. \quad \text{Ugyanez, másképp felírva: } \|\underline{v}\|^2 = \underline{v} \cdot \underline{v}.$$

**Megj:** Az  $\underline{u}$  és  $\underline{v}$  vektorok merőlegessége azt jelenti, hogy  $\|\underline{u}\|^2 + \|\underline{v}\|^2 = \|\underline{u} - \underline{v}\|^2 = (\underline{u} - \underline{v}) \cdot (\underline{u} - \underline{v}) = \underline{u} \cdot \underline{u} + \underline{v} \cdot \underline{v} - 2\underline{u} \cdot \underline{v} = \|\underline{u}\|^2 + \|\underline{v}\|^2 - 2\underline{u} \cdot \underline{v}$ , innen  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0$  adódik. Tehát  $\underline{u} \cdot \underline{v} = 0 \iff \underline{u} \perp \underline{v}$ .

## További vektorszorzások 3D-ben

**Megf:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$   $\underline{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok által feszített paralelepipedon előjeles térfogata kiszámítható oszlop szerinti kifejtéssel:

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}$$

## További vektorszorzások 3D-ben

**Megf:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$   $\underline{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok által feszített paralelepipedon előjeles térfogata kiszámítható oszlop szerinti kifejtéssel:

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = u_1 \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix}$$

## További vektorszorzások 3D-ben

**Megf:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$   $\underline{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok által feszített paralelepipedon előjeles térfogata kiszámítható oszlop szerinti kifejtéssel:

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = u_1 \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$



## További vektorszorzások 3D-ben

**Megf:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok által feszített paralelepipedon előjeles térfogata kiszámítható oszlop szerinti kifejtéssel:

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = u_1 \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

**Megj:** (1) A paralelepipedon fent kiszámított előjeles területét szokás az  $\underline{u}$ ,  $\underline{v}$ ,  $\underline{w}$  vektorok  $(\underline{u}\underline{v}\underline{w})$ -vel jelölt **vegyes szorzatának** is hívni. Könnyen látható, hogy  $(\underline{u}\underline{v}\underline{w}) = \underline{u} \cdot (\underline{v} \times \underline{w})$ , ahol  $\underline{v} \times \underline{w}$  a jól ismert vektoriális szorzat amit a jobbkéz-szabály segítségével számíthatunk ki a  $\underline{v}$  és  $\underline{w}$  vektorok által feszített paralelogramma területét is felhasználva. A fenti számítással igazolható a vektoriális szorzatot kiszámító determinánsokkal felírt képlet helyessége.

## További vektorszorzások 3D-ben

**Megf:** Az  $\underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$ ,  $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$   $\underline{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$  vektorok által feszített paralelepipedon előjeles térfogata kiszámítható oszlop szerinti kifejtéssel:

$$\begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix} = u_1 \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

**Megj:** (1) A paralelepipedon fent kiszámított előjeles területét szokás az  $\underline{u}$ ,  $\underline{v}$ ,  $\underline{w}$  vektorok  $(\underline{u}\underline{v}\underline{w})$ -vel jelölt **vegyes szorzatának** is hívni. Könnyen látható, hogy  $(\underline{u}\underline{v}\underline{w}) = \underline{u} \cdot (\underline{v} \times \underline{w})$ , ahol  $\underline{v} \times \underline{w}$  a jól ismert vektoriális szorzat amit a jobbkéz-szabály segítségével számíthatunk ki a  $\underline{v}$  és  $\underline{w}$  vektorok által feszített paralelogramma területét is felhasználva. A fenti számítással igazolható a vektoriális szorzatot kiszámító determinánsokkal felírt képlet helyessége.

(2) Ez a dia nem kapcsolódik szorosan a tananyaghoz, de érdekes látni a különféle vektorműveleteknek ezt a kapcsolatát is.

## Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^\top \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

## Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^\top \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

## Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

# Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & & \end{pmatrix}$$

## Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & \end{pmatrix}$$

# Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$



# Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

# Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

## Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

# Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

## Mátrixok szorzása

Az  $\mathbb{R}^n$ -beli (oszlop)vektorok  $n \times 1$  méretű mátrixnak is tekinthetők. Két ilyen vektort ( $n > 1$  esetén) nem lehet összeszorozni, de ha az egyiket transzponáljuk, akkor már igen:  $\underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^n$  esetén  $\underline{u}^T \cdot \underline{v} := \underline{u} \cdot \underline{v}$ , vagyis egy  $n$  dimenziós sor- és oszlopvektor szorzata egy  $1 \times 1$  méretű mátrix, ami a két vektor skaláris szorzatát tartalmazza.

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

## Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

**Biz:** A skaláris szorzásról tanult azonosság szerint

$\lambda(\underline{u} \cdot \underline{v}) = (\lambda \underline{u}) \cdot \underline{v} = \underline{u} \cdot (\lambda \underline{v})$ . Ezért mindhárom szorzatban az  $i$ -dik sor  $j$ -dik eleme az  $A$   $i$ -dik sora és  $B$   $j$ -dik oszlopa skaláris szorzatának a  $\lambda$ -szorosa ( $\forall i, j$  esetén). □



# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

$$(2) A(B + C) = AB + AC \quad \text{ill.} \quad (A + B)C = AC + BC.$$

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

$$(2) A(B + C) = AB + AC \text{ ill. } (A + B)C = AC + BC.$$

**Biz:** Tudjuk, hogy  $\underline{u} \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \underline{u} \cdot \underline{v} + \underline{u} \cdot \underline{w}$ . Ezért  $A(B + C)$  ill.  $AB + AC$   $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $A$   $i$ -dik sorának és  $B$  és  $C$   $j$ -dik oszlopai összegének skaláris szorzata ( $\forall i, j$  esetén). A másik disztributivitás a skaláris szorzás  $(\underline{u} + \underline{v}) \cdot \underline{w} = \underline{u} \cdot \underline{w} + \underline{v} \cdot \underline{w}$  azonosságából következik. □

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

$$(2) A(B + C) = AB + AC \quad \text{ill.} \quad (A + B)C = AC + BC.$$

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

- (1)  $\lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$
- (2)  $A(B + C) = AB + AC$  ill.  $(A + B)C = AC + BC$ .
- (3)  $(AB)^T = B^T A^T$ .

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$



**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

$$(1) \lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$$

$$(2) A(B + C) = AB + AC \quad \text{ill.} \quad (A + B)C = AC + BC.$$

$$(3) (AB)^T = B^T A^T.$$

**Biz:**  $(AB)^T$   $j$ -dik sorának  $i$ -dik eleme az  $A$   $i$ -dik sorának és  $B$   $j$ -dik oszlopának a skaláris szorzata, ami ugyanaz, mint  $B^T$   $j$ -dik sorának és  $A^T$   $i$ -dik oszlopának a skaláris szorzata ( $\forall i, j$  esetén).  $\square$



# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

- (1)  $\lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$
- (2)  $A(B + C) = AB + AC$  ill.  $(A + B)C = AC + BC$ .
- (3)  $(AB)^T = B^T A^T$ .

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

- (1)  $\lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$
- (2)  $A(B + C) = AB + AC$  ill.  $(A + B)C = AC + BC$ .
- (3)  $(AB)^T = B^T A^T$ .

**Megj:** Ha  $AB$  és  $BA$  is értelmes, akkor  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  és  $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ . Ekkor  $AB \in \mathbb{R}^{n \times n}$  és  $BA \in \mathbb{R}^{k \times k}$ . Azonban még  $k = n$  esetén sem igaz általában, hogy  $AB = BA$ . A mátrixszorzás nem kommutatív.



# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

- (1)  $\lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$
- (2)  $A(B + C) = AB + AC$  ill.  $(A + B)C = AC + BC$ .
- (3)  $(AB)^T = B^T A^T$ .

**Megj:** Ha  $AB$  és  $BA$  is értelmes, akkor  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  és  $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ . Ekkor  $AB \in \mathbb{R}^{n \times n}$  és  $BA \in \mathbb{R}^{k \times k}$ . Azonban még  $k = n$  esetén sem igaz általában, hogy  $AB = BA$ . A mátrixszorzás nem kommutatív.

**Megj:** A mátrixszorzás asszociatív (átzárójelezhető), de ezt később bizonyítjuk. (A def.-ből is belátható, de az nem túl elegáns.)

# Mátrixok szorzása

**Def:** Tfh az  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix **sorvektorai**  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_n$  és a  $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$  mátrix **oszlopvektorai**  $\underline{b}^1, \dots, \underline{b}^\ell$ . Ekkor az  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times \ell}$  szorzatmátrix  $i$ -dik sorának  $j$ -dik eleme az  $\underline{a}_i \cdot \underline{b}^j$  skaláris szorzat.

**Példa:**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & \\ 2 & 3 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{ill.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ 1 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

**Megf:** Ha a képletek bal oldala értelmes, akkor igazak az alábbi azonosságok.

- (1)  $\lambda \cdot AB = (\lambda A)B = A(\lambda \cdot B)$
- (2)  $A(B + C) = AB + AC$  ill.  $(A + B)C = AC + BC$ .
- (3)  $(AB)^T = B^T A^T$ .

**Megj:** Ha  $AB$  és  $BA$  is értelmes, akkor  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  és  $B \in \mathbb{R}^{k \times n}$ . Ekkor  $AB \in \mathbb{R}^{n \times n}$  és  $BA \in \mathbb{R}^{k \times k}$ . Azonban még  $k = n$  esetén sem igaz általában, hogy  $AB = BA$ . A mátrixszorzás nem kommutatív.

**Megj:** A mátrixszorzás asszociatív (átzárójelezhető), de ezt később bizonyítjuk. (A def.-ből is belátható, de az nem túl elegáns.)

**Determinánsok szorzástétele:**  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n} \Rightarrow |AB| = |A||B|$ .

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

**Biz:** Könnyen látszik a definícióból.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & j & & & \\ \hline A & & & & \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \underline{e}_j \end{array} & \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \hline A \underline{e}_j \end{array} \end{array}$$

Az  $\underline{e}_j^T$ -tal szorzás hasonló tulajdonsága következik az oszlopokról szóló fenti állításból és a transzponáltak szorzásáról tanultakból.  $\square$

Az itt látható ábra „transzponáltjának” segítségével sem nehéz erről meggyőződni.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyégvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

**Biz:** Az  $A \cdot I_k$  mátrix  $j$ -dik oszlopa definíció szerint  $A \cdot \underline{e}_j$ . Ez (1) miatt épp az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa  $\forall j$ .

Hasonlóan,  $I_n \cdot A$   $i$ -dik sora (1) miatt az  $A$   $i$ -dik sora  $\forall i$ . □

$$(\underline{a}_1, \underline{a}_2, \dots, \underline{a}_k) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

**Biz:** Az  $A \cdot I_k$  mátrix  $j$ -dik oszlopa definíció szerint  $A \cdot \underline{e}_j$ . Ez (1) miatt épp az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa  $\forall j$ .

Hasonlóan,  $I_n \cdot A$   $i$ -dik sora (1) miatt az  $A$   $i$ -dik sora  $\forall i$ . □

$$\begin{pmatrix} \underline{a}_1 & \underline{a}_2 & \dots & \underline{a}_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

**Biz:** Az  $A \cdot I_k$  mátrix  $j$ -dik oszlopa definíció szerint  $A \cdot \underline{e}_j$ . Ez (1) miatt épp az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa  $\forall j$ .

Hasonlóan,  $I_n \cdot A$   $i$ -dik sora (1) miatt az  $A$   $i$ -dik sora  $\forall i$ . □

$$\left( \underline{a}_1, \underline{a}_2, \dots, \underline{a}_k \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

# A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

**Biz:** Az  $A \cdot I_k$  mátrix  $j$ -dik oszlopa definíció szerint  $A \cdot \underline{e}_j$ . Ez (1) miatt épp az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa  $\forall j$ .

Hasonlóan,  $I_n \cdot A$   $i$ -dik sora (1) miatt az  $A$   $i$ -dik sora  $\forall i$ . □

$$\begin{pmatrix} \underline{a}_1 & \underline{a}_2 & \dots & \underline{a}_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyégvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

# A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Biz:** Tfh  $\underline{u} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}$ . Ekkor  $\underline{u} = \lambda_1 \underline{e}_1 + \dots + \lambda_k \underline{e}_k$ , így aztán

$A \cdot \underline{u} = A \cdot (\lambda_1 \underline{e}_1 + \dots + \lambda_k \underline{e}_k) = \lambda_1 A \cdot \underline{e}_1 + \dots + \lambda_k A \cdot \underline{e}_k$ , és (1) miatt  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa  $\forall j$ .

A  $\underline{v} \cdot A$ -ra vonatkozó tulajdonság hasonlóan igazolható. □

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyékvektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Köv:** Tfh  $A$  oszlopai  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  és  $B$  sorai  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$ . Ekkor

(1) az  $AB$  szorzat  $j$ -dik oszlopa az  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  oszlopok lineáris kombinációja, az együtthatókat a  $\underline{b}^j$  oszlop tartalmazza.



# A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Köv:** Tfh  $A$  oszlopai  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  és  $B$  sorai  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$ . Ekkor

(1) az  $AB$  szorzat  $j$ -dik oszlopa az  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  oszlopok lineáris kombinációja, az együtthatókat a  $\underline{b}^j$  oszlop tartalmazza.

(2) Hasonlóan, az  $i$ -dik sor a  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$  sorok lineáris kombinációja, az  $\underline{a}_i$  sorban szereplő együtthatókkal.

# A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Köv:** Tfh  $A$  oszlopai  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  és  $B$  sorai  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$ . Ekkor

(1) az  $AB$  szorzat  $j$ -dik oszlopa az  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  oszlopok lineáris kombinációja, az együtthatókat a  $\underline{b}^j$  oszlop tartalmazza.

(2) Hasonlóan, az  $i$ -dik sor a  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$  sorok lineáris kombinációja, az  $\underline{a}_i$  sorban szereplő együtthatókkal.

**Példa:** 
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -2 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

# A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Köv:** Tfh  $A$  oszlopai  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  és  $B$  sorai  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$ . Ekkor

(1) az  $AB$  szorzat  $j$ -dik oszlopa az  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  oszlopok lineáris kombinációja, az együtthatókat a  $\underline{b}^j$  oszlop tartalmazza.

(2) Hasonlóan, az  $i$ -dik sor a  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$  sorok lineáris kombinációja, az  $\underline{a}_i$  sorban szereplő együtthatókkal.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Köv:** Tfh  $A$  oszlopai  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  és  $B$  sorai  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$ . Ekkor

(1) az  $AB$  szorzat  $j$ -dik oszlopa az  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  oszlopok lineáris kombinációja, az együtthatókat a  $\underline{b}^j$  oszlop tartalmazza.

(2) Hasonlóan, az  $i$ -dik sor a  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$  sorok lineáris kombinációja, az  $\underline{a}_i$  sorban szereplő együtthatókkal.

(3) Ha a  $C$  mátrix minden oszlopa az  $A$  oszlopainak lin.komb-ja, akkor  $C$  előáll  $AB$  alakban. Ha a  $C$  mátrix sorai az  $A$  sorainak lin.komb-i, akkor  $C$  előáll  $C = BA$  alakban.

## A mátrixszorzás egy különös tulajdonsága

**Def:** Az  $n \times n$  méretű **egységmátrix**  $I_n = E_n = (\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n)$ , ahol  $\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_n$  az  $\mathbb{R}^n$  standard bázisa.

**Megf:** Legyen  $A$  tetsz.  $n \times k$  méretű mátrix. Ekkor

(1) tetsz.  $\underline{e}_j \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^n$  egyévektorok esetén  $A \cdot \underline{e}_j$  az  $A$  mátrix  $j$ -dik oszlopa,  $\underline{e}_i^T \cdot A$  pedig az  $A$  mátrix  $i$ -dik sora.

(2)  $A \cdot I_k = I_n \cdot A = A$

(3) Ha  $\underline{u} \in \mathbb{R}^k$  és  $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ , akkor  $A \cdot \underline{u}$  az  $A$  oszlopainak  $\underline{v}^T \cdot A$  pedig az  $A$  sorainak lin.komb-ja.

**Köv:** Tfh  $A$  oszlopai  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  és  $B$  sorai  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$ . Ekkor

(1) az  $AB$  szorzat  $j$ -dik oszlopa az  $\underline{a}^1, \dots, \underline{a}^k$  oszlopok lineáris kombinációja, az együtthatókat a  $\underline{b}^j$  oszlop tartalmazza.

(2) Hasonlóan, az  $i$ -dik sor a  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_k$  sorok lineáris kombinációja, az  $\underline{a}_i$  sorban szereplő együtthatókkal.

(3) Ha a  $C$  mátrix minden oszlopa az  $A$  oszlopainak lin.komb-ja, akkor  $C$  előáll  $AB$  alakban. Ha a  $C$  mátrix sorai az  $A$  sorainak lin.komb-i, akkor  $C$  előáll  $C = BA$  alakban.

**Köv:** Ha  $A'$  ESÁ-okkal kapható  $A$ -ból, akkor  $A' = BA$  alakú.

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

$$(1) A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v} \quad \text{ill.} \quad (2) A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v} \text{ teljesül.}$$

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Példa:** Lin.lekép  $\mathbb{R}^2$ -ből  $\mathbb{R}^2$ -be (a szokásos helyvektorokon) az origóra tükrözés, az origó körüli forgatás, az  $x$  tengelyre vetítés, vagy egy origón átmenő egyenesre tükrözés.  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  lineáris leképezés, ha pl. az sík minden  $(x, y)$  pontjához a tér  $(2x, 0, y/2)$  pontját rendeljük.



## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Megf:** Tetsz.  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  esetén az  $A$ -val történő balszorzás lin.lekép-t definiál  $\mathbb{R}^k$ -ből  $\mathbb{R}^n$ -be.

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Megf:** Tetsz.  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  esetén az  $A$ -val történő balszorzás lin.lekép-t definiál  $\mathbb{R}^k$ -ből  $\mathbb{R}^n$ -be.

**Kínzó kérdés:** Minden lin.lekép megadható mátrixszorzással?

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Megf:** Tetsz.  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  esetén az  $A$ -val történő balszorzás lin.lekép-t definiál  $\mathbb{R}^k$ -ből  $\mathbb{R}^n$ -be.

**Kínzó kérdés:** Minden lin.lekép megadható mátrixszorzással?

**Megnyugtató válasz:** Igen.

## Lineáris leképezések

**Megf:** Ha  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , akkor  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  olyan  $\mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  leképezés, amire  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $A(\lambda \underline{v}) = \lambda \cdot A\underline{v}$  ill. (2)  $A(\underline{u} + \underline{v}) = A\underline{u} + A\underline{v}$  teljesül.

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Megf:** Tetsz.  $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$  esetén az  $A$ -val történő balszorzás lin.lekép-t definiál  $\mathbb{R}^k$ -ből  $\mathbb{R}^n$ -be.

**Kínzó kérdés:** Minden lin.lekép megadható mátrixszorzással?

**Megnyugtató válasz:** Igen. Ezt fogjuk most igazolni.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$       ill.      (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Biz:**  $\Rightarrow$ : Mivel  $f$  additív és homogén, ezért

$$f(\lambda_1 \underline{u}_1 + \dots + \lambda_k \underline{u}_k) = f(\lambda_1 \underline{u}_1) + \dots + f(\lambda_k \underline{u}_k) = \lambda_1 f(\underline{u}_1) + \dots + \lambda_k f(\underline{u}_k),$$

azaz  $f$  zárt a lin.komb-ra.



## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Biz:**  $\Rightarrow$ : Mivel  $f$  additív és homogén, ezért

$$f(\lambda_1 \underline{u}_1 + \dots + \lambda_k \underline{u}_k) = f(\lambda_1 \underline{u}_1) + \dots + f(\lambda_k \underline{u}_k) = \lambda_1 f(\underline{u}_1) + \dots + \lambda_k f(\underline{u}_k),$$

azaz  $f$  zárt a lin.komb-ra.

$\Leftarrow$ : Ha  $f$  zárt a lin.komb-ra, akkor  $f(\lambda \underline{u}) = \lambda f(\underline{u})$ , hisz  $\lambda \underline{u}$  az  $u$  lin.komb-ja, továbbá

$f(\underline{u} + \underline{v}) = f(1\underline{u} + 1\underline{v}) = 1f(\underline{u}) + 1f(\underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$ , tehát  $f$  homogén és additív, más szóval  $f$  lin.lekép. □

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

Annak az igazolásához, hogy minden  $f$  lin.lekép előáll mátrixszal történő balszorzással csupán azt kell megmutatni, hogy van olyan  $[f]$  mátrix, amire  $f(\underline{b}_i) = [f]\underline{b}_i$  teljesül minden  $\underline{b}_i$  báziselemre.

Ekkor ugyanis az  $[f]$ -fel való balszorzás lin.lekép, továbbá a fenti Következmény miatt  $f(\underline{v}) = [f]\underline{v}$ , azaz minden vektor  $f$  szerinti képe megkapható az  $[f]$  mátrixszal történő balszorzással.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m$  az  $U$  bázisa és  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m \in V$  tetsz. vektorok. Ekkor van olyan  $[f] \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix, amire  $[f] \underline{b}_i = \underline{v}_i$  teljesül  $\forall 1 \leq i \leq m$  esetén.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m$  az  $U$  bázisa és  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m \in V$  tetsz. vektorok. Ekkor van olyan  $[f] \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix, amire  $[f]\underline{b}_i = \underline{v}_i$  teljesül  $\forall 1 \leq i \leq m$  esetén.

**Biz:** Legyen  $B = (\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m)$ .  $B$  oszlopai lin.ftn-ek, ezért a  $B$  ESÁ-okkal RLA mátrixszá transzformált alakja  $(\underline{e}_1, \dots, \underline{e}_m)$ , azaz  $I_m$  áll az RLA mátrix tetején. Minden  $m$  oszlopból álló mátrix, így  $F = (\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m)$  is megkapható  $I_m$  sorainak lin.komb-jaként.

Tehát  $F$  sorai előállnak  $B$  sorainak lin.komb-jaként, vagyis van olyan  $[f]$  mátrix, amire  $[f]B = F$ , azaz  $[f]\underline{b}_i = \underline{v}_i \quad \forall i$ . □

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m$  az  $U$  bázisa és  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m \in V$  tetsz. vektorok. Ekkor van olyan  $[f] \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix, amire  $[f] \underline{b}_i = \underline{v}_i$  teljesül  $\forall 1 \leq i \leq m$  esetén.



## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m$  az  $U$  bázisa és  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m \in V$  tetsz. vektorok. Ekkor van olyan  $[f] \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix, amire  $[f]\underline{b}_i = \underline{v}_i$  teljesül  $\forall 1 \leq i \leq m$  esetén.

**Köv:** Tetsz.  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép esetén  $[f]\underline{u} = f(\underline{u})$  teljesül a Lemmában definiált  $[f]$  mátrixra  $\forall \underline{u} \in U$  esetén, azaz minden lineáris leképezés előáll mátrixszal történő balszorzással.

## Lineáris leképezések

**Def:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k$  és  $V \leq \mathbb{R}^n$ . Az  $f : U \rightarrow V$  **lineáris leképezés**, ha homogén és additív, azaz ha  $\forall \underline{u}, \underline{v} \in \mathbb{R}^k, \forall \lambda \in \mathbb{R}$  esetén

(1)  $f(\lambda \underline{v}) = \lambda f(\underline{v})$  ill. (2)  $f(\underline{u} + \underline{v}) = f(\underline{u}) + f(\underline{v})$  teljesül.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n$ . Ekkor  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\iff$   $f$  zárt a lin.komb-ra, azaz  $f(\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{u}_i) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{u}_i) \quad \forall \lambda_i, \underline{u}_i$ .

**Köv:** Ha  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép,  $B = \{\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m\}$  az  $U$  bázisa és  $\underline{u} = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i \underline{b}_i$ , akkor  $f(\underline{u}) = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i f(\underline{b}_i)$ , azaz a báziselemeken felvett értékek egyértelműen meghatározzák a lin.lekép-t.

**Lemma:** Tfh  $U \leq \mathbb{R}^k, V \leq \mathbb{R}^n, f : U \rightarrow V$  lin.lekép  $\underline{b}_1, \dots, \underline{b}_m$  az  $U$  bázisa és  $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_m \in V$  tetsz. vektorok. Ekkor van olyan  $[f] \in \mathbb{R}^{n \times k}$  mátrix, amire  $[f] \underline{b}_i = \underline{v}_i$  teljesül  $\forall 1 \leq i \leq m$  esetén.

**Köv:** Tetsz.  $f : U \rightarrow V$  lin.lekép esetén  $[f] \underline{u} = f(\underline{u})$  teljesül a Lemmában definiált  $[f]$  mátrixra  $\forall \underline{u} \in U$  esetén, azaz minden lineáris leképezés előáll mátrixszal történő balszorzással.

Azt fogjuk most megfigyelni, hogyan is kell az  $f$  lineáris leképezés  $[f]$  mátrixát kiszámítani a báziselemek képeinek segítségével.

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Biz:**  $A \cdot \underline{e}_i$  az  $A$   $i$ -dik oszlopa, vagyis  $\underline{a}_i \ \forall i$ . □

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.


## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .





## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Biz:** Először igazoljuk  $g \circ f$  linearitását.

$g(f(\lambda \underline{u})) = g(\lambda f(\underline{u})) = \lambda g(f(\underline{u}))$  homogén, ill.

$g(f(\underline{u} + \underline{v})) = g(f(\underline{u}) + f(\underline{v})) = g(f(\underline{u})) + g(f(\underline{v}))$  lineáris.

Tehát  $g \circ f$  csakugyan lineáris leképezés.

Végül a kompozíciómátrixról szóló képlet helyességét bizonyítjuk.

# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Biz:**

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Biz:** A tanultak szerint  $[g \circ f]$   $i$ -dik oszlopa  $g(f(\underline{e}_i)) = [g]([f]\underline{e}_i)$ . Láttuk, hogy  $[f]\underline{e}_i$  az  $[f]$   $i$ -dik oszlopa, így  $[g]([f]\underline{e}_i)$  a  $[g]$  mátrix szorzata az  $[f]$  mátrix  $i$ -dik oszlopával.

Ez pedig nem más, mint az  $[g][f]$  szorzatmátrix  $i$ -dik oszlopa. Ezek szerint  $[g \circ f] = [g][f]$ . □

# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Köv:** Ha értelmesek a műveletek, akkor  $A(BC) = (AB)C$ .

## Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Köv:** Ha értelmesek a műveletek, akkor  $A(BC) = (AB)C$ .

**Biz:** Legyen  $f, g$  és  $h$  az  $A, B$  ill.  $C$  mátrixokhoz tartozó lin.lekép. Ekkor  $A(BC)$  az  $f \circ (g \circ h)$ ,  $(AB)C$  pedig az  $(f \circ g) \circ h$  leképezés mátrixa. Márpedig  $f \circ (g \circ h)(\underline{v}) = f(g(h(\underline{v}))) = (f \circ g) \circ h(\underline{v})$  miatt e két leképezés megegyezik, így a mátrixaik is azonosak.  $\square$



# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Köv:** Ha értelmesek a műveletek, akkor  $A(BC) = (AB)C$ .

# Lineáris leképezés mátrixa

**Megf:** Tfh  $\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k \in \mathbb{R}^n$  és  $A = (\underline{a}_1, \dots, \underline{a}_k)$ . Ekkor a  $\underline{v} \mapsto A\underline{v}$  lin.lekép az  $\underline{e}_i \in \mathbb{R}^k$  egységvektort  $\underline{a}_i$ -be viszi ( $\forall 1 \leq i \leq k$ ).

**Köv:** Tfh  $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$  lin.lekép. Legyen  $[f] = (f(\underline{e}_1), \dots, f(\underline{e}_k))$ . Ekkor  $[f]\underline{v} = f(\underline{v})$  teljesül  $\forall \underline{v} \in \mathbb{R}^k$  esetén.

**Def:** A fenti  $[f]$  mátrix az  $f$  **lineáris leképezés mátrixa**.

**Példa:** Legyen  $f_\alpha$  az origó körüli  $\alpha$  szögű elforgatás  $\mathbb{R}^2$ -ben. Ekkor  $f_\alpha(\underline{e}_1) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$  ill.  $f_\alpha(\underline{e}_2) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ , így  $[f_\alpha] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

**Lemma:** Tfh  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$  és  $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  lin.lekép-ek. Ekkor  $g \circ f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^\ell$  is lin.lekép, ahol  $(g \circ f)(\underline{v}) = g(f(\underline{v}))$  és  $[g \circ f] = [g][f]$ .

**Köv:** Ha értelmesek a műveletek, akkor  $A(BC) = (AB)C$ .

**Köv:** A fenti példában szereplő elforgatásokra igaz, hogy

$$f_{\alpha+\beta} = f_\alpha \circ f_\beta, \text{ így } \begin{pmatrix} \cos(\alpha+\beta) & -\sin(\alpha+\beta) \\ \sin(\alpha+\beta) & \cos(\alpha+\beta) \end{pmatrix} = [f_{\alpha+\beta}] = [f_\alpha][f_\beta] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta & \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \end{pmatrix}$$

Ebből pedig  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$  ill.

$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$  adódik.

Mit tanultunk ma?

# Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)

## Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)
- ▶ Vektorok skaláris szorzása (3D: vektoriális és vegyesszorzat)

# Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)
- ▶ Vektorok skaláris szorzása (3D: vektoriális és vegyesszorzat)
- ▶ Mátrixszorzás és elemi tulajdonságai (disztributivitások, asszociatitások, transzponálás)

# Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)
- ▶ Vektorok skaláris szorzása (3D: vektoriális és vegyesszorzat)
- ▶ Mátrixszorzás és elemi tulajdonságai (disztributivitások, asszociatitások, transzponálás)
- ▶ Szorzatmátrix sorainak és oszlopainak viszonya a tényezők soraihoz és oszlopaihoz

# Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)
- ▶ Vektorok skaláris szorzása (3D: vektoriális és vegyesszorzat)
- ▶ Mátrixszorzás és elemi tulajdonságai (disztributivitások, asszociatitások, transzponálás)
- ▶ Szorzatmátrix sorainak és oszlopainak viszonya a tényezők soraihoz és oszlopaihoz
- ▶ Lineáris leképezések és mátrixszal történő balról szorzások



# Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)
- ▶ Vektorok skaláris szorzása (3D: vektoriális és vegyesszorzat)
- ▶ Mátrixszorzás és elemi tulajdonságai (disztributivitások, asszociatitások, transzponálás)
- ▶ Szorzatmátrix sorainak és oszlopainak viszonya a tényezők soraihoz és oszlopaihoz
- ▶ Lineáris leképezések és mátrixszal történő balról szorzások
- ▶ Lineáris leképezések és ezek kompozícióinak mátrixa

## Mit tanultunk ma?

- ▶ Koordinátánként értelmezett mátrixműveletek (+, skalárral szorzás)
- ▶ Vektorok skaláris szorzása (3D: vektoriális és vegyesszorzat)
- ▶ Mátrixszorzás és elemi tulajdonságai (disztributivitások, asszociatitások, transzponálás)
- ▶ Szorzatmátrix sorainak és oszlopainak viszonya a tényezők soraihoz és oszlopaihoz
- ▶ Lineáris leképezések és mátrixszal történő balról szorzások
- ▶ Lineáris leképezések és ezek kompozícióinak mátrixa

**Köszönöm a figyelmet!**