

# Adatbázisok elmélete 5. előadás

Katona Gyula Y.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
Számítástudományi Tsz.

I. B. 137/b

`kiskat@cs.bme.hu`

`http://www.cs.bme.hu/~kiskat`

2004

## A relációs algebra alapműveletei (emlékeztető)

- Halmazműveletek (bármilyen halmazra mennének)
  - ★ unió:  $\cup$
  - ★ különbség:  $\setminus$
  - ★ szorzat:  $\times$

## A relációs algebra alapműveletei (emlékeztető)

- Halmazműveletek (bármilyen halmazra mennének)
  - ★ unió:  $\cup$
  - ★ különbség:  $\setminus$
  - ★ szorzat:  $\times$
- Relációs műveletek (ezek már kihasználják, hogy itt relációkról van szó)
  - ★ vetítés, projekció:  $\pi$
  - ★ kiválasztás, szelekció:  $\sigma$

## A relációs algebra alapműveletei (emlékeztető)

- Halmazműveletek (bármilyen halmazra mennének)
  - ★ unió:  $\cup$
  - ★ különbség:  $\setminus$
  - ★ szorzat:  $\times$
- Relációs műveletek (ezek már kihasználják, hogy itt relációról van szó)
  - ★ vetítés, projekció:  $\pi$
  - ★ kiválasztás, szelekció:  $\sigma$

Ezek mind tiszta műveletek: reláció  $\rightarrow$  reláció

## A relációs algebra alapműveletei (emlékeztető)

- Halmazműveletek (bármilyen halmazra mennének)
  - ★ unió:  $\cup$
  - ★ különbség:  $\setminus$
  - ★ szorzat:  $\times$
- Relációs műveletek (ezek már kihasználják, hogy itt relációról van szó)
  - ★ vetítés, projekció:  $\pi$
  - ★ kiválasztás, szelekció:  $\sigma$

Ezek mind tiszta műveletek: reláció  $\rightarrow$  reláció

$\Rightarrow$  gond nélkül egymásba ágyazhatók

## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\implies R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai

## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\implies R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai  
Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek.

## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai  
Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek. (Gyakorlatban néha lehetnek azonos sorok.)



## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai  
Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek. (Gyakorlatban néha lehetnek azonos sorok.)
- csak akkor alkalmazható, ha  $R$  és  $S$  oszlopszáma egyenlő

## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\implies R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai  
Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek. (Gyakorlatban néha lehetnek azonos sorok.)
- csak akkor alkalmazható, ha  $R$  és  $S$  oszlopszáma egyenlő
- nem feltétlenül örököl típusokat vagy attribútum neveket

## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai  
Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek. (Gyakorlatban néha lehetnek azonos sorok.)
- csak akkor alkalmazható, ha  $R$  és  $S$  oszlopszáma egyenlő
- nem feltétlenül örököl típusokat vagy attribútum neveket
- Példa:

$R$	$A$	$B$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$

$S$	$A$	$C$
	$a$	$a$
	$a$	$d$
	$a$	$c$
	$b$	$b$

## Műveletek

### Unió (emlékeztető)

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \cup S =$  sorai vagy  $R$  vagy  $S$  sorai  
Azonos sorok csak egyszer szerepeljenek. (Gyakorlatban néha lehetnek azonos sorok.)
- csak akkor alkalmazható, ha  $R$  és  $S$  oszlopszáma egyenlő
- nem feltétlenül örököl típusokat vagy attribútum neveket
- Példa:

$R$	$A$	$B$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$

$S$	$A$	$C$
	$a$	$a$
	$a$	$d$
	$a$	$c$
	$b$	$b$

$R \cup S$	$A$	$(R \cup S)_2$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$
	$a$	$d$
	$b$	$b$

## Műveletek

### Különbség

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \setminus S = R$  azon sorai, amelyek  $S$ -ben nem szerepelnek

## Műveletek

### Különbség

- $R, S$  relációk  $\implies R \setminus S = R$  azon sorai, amelyek  $S$ -ben nem szerepelnek
- nincs kompatibilitási követelmény (Ha pl. különböző az oszlopszám, nem szerepelhetnek azonos sorok úgysem. Ekkor  $R \setminus S = R$ )

## Műveletek

### Különbség

- $R, S$  relációk  $\implies R \setminus S = R$  azon sorai, amelyek  $S$ -ben nem szerepelnek
- nincs kompatibilitási követelmény (Ha pl. különböző az oszlopszám, nem szerepelhetnek azonos sorok úgysem. Ekkor  $R \setminus S = R$ )
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit (mert  $R \setminus S \subseteq R$ )

## Műveletek

### Különbség

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \setminus S = R$  azon sorai, amelyek  $S$ -ben nem szerepelnek
- nincs kompatibilitási követelmény (Ha pl. különböző az oszlopszám, nem szerepelhetnek azonos sorok úgysem. Ekkor  $R \setminus S = R$ )
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit (mert  $R \setminus S \subseteq R$ )
- Példa:

$R$	$A$	$B$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$

$S$	$A$	$C$
	$a$	$a$
	$a$	$d$
	$a$	$c$
	$b$	$b$



## Műveletek

### Különbség

- $R, S$  relációk  $\Rightarrow R \setminus S = R$  azon sorai, amelyek  $S$ -ben nem szerepelnek
- nincs kompatibilitási követelmény (Ha pl. különböző az oszlopszám, nem szerepelhetnek azonos sorok úgysem. Ekkor  $R \setminus S = R$ )
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit (mert  $R \setminus S \subseteq R$ )
- Példa:

$R$	$A$	$B$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$

$S$	$A$	$C$
	$a$	$a$
	$a$	$d$
	$a$	$c$
	$b$	$b$

$R \setminus S$	$A$	$B$
	$b$	$a$

## Műveletek

### Szorzat (direkt szorzat, Descartes szorzat)

- $R(A_1, \dots, A_k), S(B_1, \dots, B_l)$   $k$  ill.  $l$  attribútumos relációk  $\implies R \times S =$  egy  $k + l$  attribútumos reláció,  $R$  minden sora mögé odatesszük  $S$  minden sorát, minden lehetséges módon.

## Műveletek

### Szorzat (direkt szorzat, Descartes szorzat)

- $R(A_1, \dots, A_k), S(B_1, \dots, B_l)$   $k$  ill.  $l$  attribútumos relációk  $\implies R \times S =$  egy  $k + l$  attribútumos reláció,  $R$  minden sora mögé odatesszük  $S$  minden sorát, minden lehetséges módon.  
Ha  $R$ -nek  $n$  sora van  $S$ -nek  $m$  sora  $\implies R \times S$ -nek  $nm$  sora van

## Műveletek

### Szorzat (direkt szorzat, Descartes szorzat)

- $R(A_1, \dots, A_k), S(B_1, \dots, B_l)$   $k$  ill.  $l$  attribútumos relációk  $\implies R \times S =$  egy  $k + l$  attribútumos reláció,  $R$  minden sora mögé odatesszük  $S$  minden sorát, minden lehetséges módon.  
Ha  $R$ -nek  $n$  sora van  $S$ -nek  $m$  sora  $\implies R \times S$ -nek  $nm$  sora van
- nincs kompatibilitási követelmény

## Műveletek

### Szorzat (direkt szorzat, Descartes szorzat)

- $R(A_1, \dots, A_k), S(B_1, \dots, B_l)$   $k$  ill.  $l$  attribútumos relációk  $\implies R \times S =$  egy  $k + l$  attribútumos reláció,  $R$  minden sora mögé odatesszük  $S$  minden sorát, minden lehetséges módon.  
Ha  $R$ -nek  $n$  sora van  $S$ -nek  $m$  sora  $\implies R \times S$ -nek  $nm$  sora van
- nincs kompatibilitási követelmény
- Az eredmény lényegében örökli  $R$  és  $S$  típusait és attribútum neveit, esetleg át kell nevezni.

- Példa:

<i>R</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>

<i>S</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>b</i>

## • Példa:

<i>R</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>

<i>S</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>b</i>

$R \times S$	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A'</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

- Példa:

<i>R</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>

<i>S</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>b</i>

$R \times S$	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A'</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>d</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>c</i>
	<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b</i>

Az unió és különbség könnyű művelet, a szorzat nehezebb. Vigyázni kell mennyit használjuk.



## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\implies \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)

## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\implies \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)  $\implies$   
Veszem az oszlopokat ebben a sorrendben, a többit eldobom és a többszörös sorokat is eldobom.

## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\implies \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)  $\implies$   
Veszem az oszlopokat ebben a sorrendben, a többit eldobom és a többszörös sorokat is eldobom.  
Egy oszlop akár többször is szerepelhet.  $\implies$  átnevezés
- nincs kompatibilitási követelmény (persze amire vetítünk az  $R$ -nek attribútuma kell, hogy legyen)

## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\implies \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)  $\implies$   
Veszem az oszlopokat ebben a sorrendben, a többit eldobom és a többszörös sorokat is eldobom.  
Egy oszlop akár többször is szerepelhet.  $\implies$  átnevezés
- nincs kompatibilitási követelmény (persze amire vetítünk az  $R$ -nek attribútuma kell, hogy legyen)
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit

## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\implies \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)  $\implies$   
Veszem az oszlopokat ebben a sorrendben, a többit eldobom és a többszörös sorokat is eldobom.  
Egy oszlop akár többször is szerepelhet.  $\implies$  átnevezés
- nincs kompatibilitási követelmény (persze amire vetítünk az  $R$ -nek attribútuma kell, hogy legyen)
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit
- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	2
	$a$	$c$	3
	$b$	$c$	4

## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\implies \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)  $\implies$   
 Veszem az oszlopokat ebben a sorrendben, a többit eldobom és a többszörös sorokat is eldobom.  
 Egy oszlop akár többször is szerepelhet.  $\implies$  átnevezés
- nincs kompatibilitási követelmény (persze amire vetítünk az  $R$ -nek attribútuma kell, hogy legyen)
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit
- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	2
	$a$	$c$	3
	$b$	$c$	4

$\pi_A(R)$	$A$
	$a$
	$b$

## Műveletek

### Vetítés

- $R(A_1, \dots, A_l)$  alakú reláció  $\Rightarrow \pi_{A_{i_1}, \dots, A_{i_n}}(R)$   
 $R$  vetítése  $A_{i_1}, \dots, A_{i_n}$ -re (fontos a sorrend)  $\Rightarrow$   
 Veszem az oszlopokat ebben a sorrendben, a többit eldobom és a többszörös sorokat is eldobom.  
 Egy oszlop akár többször is szerepelhet.  $\Rightarrow$  átnevezés
- nincs kompatibilitási követelmény (persze amire vetítünk az  $R$ -nek attribútuma kell, hogy legyen)
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit
- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	2
	$a$	$c$	3
	$b$	$c$	4

$\pi_A(R)$	$A$
	$a$
	$b$

$\pi_{C,B,B}(R)$	$C$	$B$	$B$
	2	$b$	$b$
	3	$c$	$c$
	4	$c$	$c$

## Műveletek

### Kiválasztás, szelekció

- $R$  egy reláció  $\implies \sigma_F(R)$  = a reláció azon sorai, amelyekre az  $F$  formula teljesül.



## Műveletek

### Kiválasztás, szelekció

- $R$  egy reláció  $\implies \sigma_F(R)$  = a reláció azon sorai, amelyekre az  $F$  formula teljesül.
- Teljesülni fog, hogy  $\sigma_F(R) \subseteq R$

## Műveletek

### Kiválasztás, szelekció

- $R$  egy reláció  $\implies \sigma_F(R)$  = a reláció azon sorai, amelyekre az  $F$  formula teljesül.
- Teljesülni fog, hogy  $\sigma_F(R) \subseteq R$
- Nincs megszorítás, csak hogy  $F$  értelmes legyen.

## Műveletek

### Kiválasztás, szelekció

- $R$  egy reláció  $\implies \sigma_F(R)$  = a reláció azon sorai, amelyekre az  $F$  formula teljesül.
- Teljesülni fog, hogy  $\sigma_F(R) \subseteq R$
- Nincs megszorítás, csak hogy  $F$  értelmes legyen.
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit

## Műveletek

### Kiválasztás, szelekció

- $R$  egy reláció  $\implies \sigma_F(R)$  = a reláció azon sorai, amelyekre az  $F$  formula teljesül.
- Teljesülni fog, hogy  $\sigma_F(R) \subseteq R$
- Nincs megszorítás, csak hogy  $F$  értelmes legyen.
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit
- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$c$	$4$

## Műveletek

### Kiválasztás, szelekció

- $R$  egy reláció  $\implies \sigma_F(R)$  = a reláció azon sorai, amelyekre az  $F$  formula teljesül.
- Teljesülni fog, hogy  $\sigma_F(R) \subseteq R$
- Nincs megszorítás, csak hogy  $F$  értelmes legyen.
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit
- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$c$	$4$

$\sigma_{A \neq B \wedge C > 2}(R)$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$c$	$4$

Az  $F$  formula:

**Atomok:**  $A \theta B$ ,  $A \theta c$ ,  $c \theta B$ ,

ahol  $A, B$  attribútumok,  $c$  érték (konstans),  $\theta \in \{<, >, =, \leq, \geq, \neq\}$

Az  $F$  formula:

**Atomok:**  $A \theta B$ ,  $A \theta c$ ,  $c \theta B$ ,

ahol  $A, B$  attribútumok,  $c$  érték (konstans),  $\theta \in \{<, >, =, \leq, \geq, \neq\}$

**Építkezés:**  $\wedge, \vee, \neg, (, )$       **Kvantorok, nincsenek!**

Az  $F$  formula:

**Atomok:**  $A \theta B$ ,  $A \theta c$ ,  $c \theta B$ ,

ahol  $A, B$  attribútumok,  $c$  érték (konstans),  $\theta \in \{<, >, =, \leq, \geq, \neq\}$

**Építkezés:**  $\wedge, \vee, \neg, (, )$       **Kvantorok, nincsenek!**

- Példa:

DOLGOZÓ(NÉV,CÍM,FIZETÉS)

$\sigma_{\text{CÍM}='BP., Várna u.' \wedge \text{FIZETÉS} > '50000'}$  (DOLGOZÓ)



## Relációs algebra

**Definíció.** *Alapreláció:* A bevezetés, tervezés során definiált tábla, *ami meg van adva.*

## Relációs algebra

**Definíció.** *Alapreláció:* A bevezetés, tervezés során definiált tábla, *ami meg van adva.*  
*A relációs algebra relációi:* amik kifejezhetők az alaprelációkból  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$  segítségével.

## Relációs algebra

**Definíció.** *Alapreláció:* A bevezetés, tervezés során definiált tábla, *ami meg van adva.*

*A relációs algebra relációi:* amik kifejezhetők az alaprelációkból  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$  segítségével.

*Származtatott reláció:* nem alapreláció, de kifejezhető.

## Relációs algebra

**Definíció.** *Alapreláció:* A bevezetés, tervezés során definiált tábla, *ami meg van adva.*

*A relációs algebra relációi:* amik kifejezhetők az alaprelációkból  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$  segítségével.

*Származtatott reláció:* nem alapreláció, de kifejezhető.

**Definíció.** Egy lekérdező nyelv (*igazi vagy modell*) *relációsan teljes*, ha benne megvalósíthatók a relációs algebra alapműveletei:  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$

## Relációs algebra

**Definíció.** *Alapreláció:* A bevezetés, tervezés során definiált tábla, *ami meg van adva.*

*A relációs algebra relációi:* amik kifejezhetők az alaprelációkból  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$  segítségével.

*Származtatott reláció:* nem alapreláció, de kifejezhető.

**Definíció.** Egy lekérdező nyelv (*igazi vagy modell*) *relációsan teljes*, ha benne megvalósíthatók a relációs algebra alapműveletei:  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$

Ez fontos követelmény, általában tudja is mindegyik.

## Relációs algebra

**Definíció.** *Alapreláció:* A bevezetés, tervezés során definiált tábla, *ami meg van adva.*

*A relációs algebra relációi:* amik kifejezhetők az alaprelációkból  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$  segítségével.

*Származtatott reláció:* nem alapreláció, de kifejezhető.

**Definíció.** Egy lekérdező nyelv (*igazi vagy modell*) *relációsan teljes*, ha benne megvalósíthatók a relációs algebra alapműveletei:  $\cup, \setminus, \times, \pi, \sigma$

Ez fontos követelmény, általában tudja is mindegyik.

Inkább az a baj, hogy néha túl sokat tudnak, de nincs hatékony implementáció.

## Származtatott műveletek

Hasznosak, de mivel kifejezhetők az 5 alpművelettel, ezért lényegében csak rövidítések.

### Metszet

- $R, S$  relációk  $\implies R \cap S = R \setminus (R \setminus S)$  azok a sorok, amelyek mindkettőben benne vannak.

## Származtatott műveletek

Hasznosak, de mivel kifejezhetők az 5 alpművelettel, ezért lényegében csak rövidítések.

### Metszet

- $R, S$  relációk  $\implies R \cap S = R \setminus (R \setminus S)$  azok a sorok, amelyek mindkettőben benne vannak.
- nincs kompatibilitási követelmény  $\iff \setminus$  tulajdonságából



## Származtatott műveletek

Hasznosak, de mivel kifejezhetők az 5 alpművelettel, ezért lényegében csak rövidítések.

### Metszet

- $R, S$  relációk  $\implies R \cap S = R \setminus (R \setminus S)$  azok a sorok, amelyek mindkettőben benne vannak.
- nincs kompatibilitási követelmény  $\longleftarrow \setminus$  tulajdonságából
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit  
 $\longleftarrow \setminus$  tulajdonságából
- Példa:

$R$	$A$	$B$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$

$S$	$A$	$C$
	$a$	$a$
	$a$	$d$
	$a$	$c$
	$b$	$b$

## Származtatott műveletek

Hasznosak, de mivel kifejezhetők az 5 alpművelettel, ezért lényegében csak rövidítések.

### Metszet

- $R, S$  relációk  $\implies R \cap S = R \setminus (R \setminus S)$  azok a sorok, amelyek mindkettőben benne vannak.
- nincs kompatibilitási követelmény  $\iff \setminus$  tulajdonságából
- Az eredmény örökli  $R$  típusait és attribútum neveit  
 $\iff \setminus$  tulajdonságából
- Példa:

$R$	$A$	$B$
	$a$	$a$
	$a$	$c$
	$b$	$a$

$S$	$A$	$C$
	$a$	$a$
	$a$	$d$
	$a$	$c$
	$b$	$b$

$R \cap S$	$A$	$B \cap C$
	$a$	$a$
	$a$	$c$

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
     $\Rightarrow R \bowtie S =$   
    ★ Vegyük  $R \times S$ -t

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S =$ 
  - ★ Vegyük  $R \times S$ -t
  - ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S =$ 
  - ★ Vegyük  $R \times S$ -t
  - ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.
  - ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S =$ 
  - ★ Vegyük  $R \times S$ -t
  - ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többi kidobjuk.
  - ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re
  - ★ Azonos sorokat kidobjuk.

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S =$ 
  - ★ Vegyük  $R \times S$ -t
  - ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.
  - ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re
  - ★ Azonos sorokat kidobjuk.

$$R \bowtie S = \pi_{R.A_1, \dots}(\sigma_{R.A_1=S.A_1, \dots}(R \times S))$$

$R \bowtie S$ -nek  $k + r + s$  oszlopa lesz.

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S =$ 
  - ★ Vegyük  $R \times S$ -t
  - ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.
  - ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re
  - ★ Azonos sorokat kidobjuk.

$$R \bowtie S = \pi_{R.A_1, \dots}(\sigma_{R.A_1=S.A_1, \dots}(R \times S))$$

$R \bowtie S$ -nek  $k + r + s$  oszlopa lesz.

Ha nincs közös attribútum.  $\Rightarrow R \bowtie S = R \times S$ .



## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk

$$\Rightarrow R \bowtie S =$$

- ★ Vegyük  $R \times S$ -t
- ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.
- ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re
- ★ Azonos sorokat kidobjuk.

- $$R \bowtie S = \pi_{R.A_1, \dots}(\sigma_{R.A_1=S.A_1, \dots}(R \times S))$$

$R \bowtie S$ -nek  $k + r + s$  oszlopa lesz.

Ha nincs közös attribútum.  $\Rightarrow R \bowtie S = R \times S$ .

- nincs kompatibilitási követelmény

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S =$ 
  - ★ Vegyük  $R \times S$ -t
  - ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.
  - ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re
  - ★ Azonos sorokat kidobjuk.

$$R \bowtie S = \pi_{R.A_1, \dots}(\sigma_{R.A_1=S.A_1, \dots}(R \times S))$$

$R \bowtie S$ -nek  $k + r + s$  oszlopa lesz.

Ha nincs közös attribútum.  $\Rightarrow R \bowtie S = R \times S$ .

- nincs kompatibilitási követelmény
- Az eredmény örökli  $R$  és  $S$  típusait és attribútum neveit

## Származtatott műveletek

### Természetes illesztés (natural join)

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk

$$\Rightarrow R \bowtie S =$$

- ★ Vegyük  $R \times S$ -t
- ★ Vesszük azokat a sorokat, ahol  $R.A_1 = S.A_1, \dots, R.A_k = S.A_k$ , a többit kidobjuk.
- ★  $\forall A_i$ -ből az egyik példányt eldobjuk, azaz vetítünk  
 $R.A_1, \dots, R.A_k, R.B_1, \dots, R.B_r, S.C_1, \dots, S.C_s$ -re
- ★ Azonos sorokat kidobjuk.

$$R \bowtie S = \pi_{R.A_1, \dots}(\sigma_{R.A_1=S.A_1, \dots}(R \times S))$$

$R \bowtie S$ -nek  $k + r + s$  oszlopa lesz.

Ha nincs közös attribútum.  $\Rightarrow R \bowtie S = R \times S$ .

- nincs kompatibilitási követelmény
- Az eredmény örökli  $R$  és  $S$  típusait és attribútum neveit
- Gyakorlatban ennél hatékonyabban számítjuk ki.
- Az oszlopok sorrendje nem definiált, de általában:  $R$  oszlopai, aztán  $S$  saját oszlopai.

- Példa:

<i>R</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2
	<i>a</i>	<i>c</i>	3
	<i>b</i>	<i>a</i>	4

<i>S</i>	<i>D</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	2
	<i>b</i>	3
	<i>x</i>	2

## • Példa:

<i>R</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2
	<i>a</i>	<i>c</i>	3
	<i>b</i>	<i>a</i>	4

<i>S</i>	<i>D</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	2
	<i>b</i>	3
	<i>x</i>	2

$R \bowtie S$	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2	<i>x</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	3	<i>b</i>

- Példa:

<i>R</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2
	<i>a</i>	<i>c</i>	3
	<i>b</i>	<i>a</i>	4

<i>S</i>	<i>D</i>	<i>C</i>
	<i>a</i>	2
	<i>b</i>	3
	<i>x</i>	2

$R \bowtie S$	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2	<i>a</i>
	<i>a</i>	<i>b</i>	2	<i>x</i>
	<i>a</i>	<i>c</i>	3	<i>b</i>

Miért „természetes”?

Példa: TERMELŐ(TNÉV,TERMÉK,ÁR,CÍM)

Példa: TERMELŐ(TNÉV,TERMÉK,ÁR,CÍM)

- TNÉV → CÍM
- TNÉV, TERMÉK → ÁR



Példa: TERMELŐ(TNÉV,TERMÉK,ÁR,CÍM)

- TNÉV → CÍM
- TNÉV, TERMÉK → ÁR

**Gond:** TERMELŐ címét minden terméknél tároljuk

⇒ redundancia + veszélyek : cím mindig kell, minden módosításhoz; könnyen sérülhet a fent megadott függés, ha elírom a címet; akkor is kell a cím, ha csak új árut akarok felvenni)

Példa: TERMELŐ(TNÉV,TERMÉK,ÁR,CÍM)

- TNÉV → CÍM
- TNÉV, TERMÉK → ÁR

**Gond:** TERMELŐ címét minden terméknél tároljuk

⇒ redundancia + veszélyek : cím mindig kell, minden módosításhoz; könnyen sérülhet a fent megadott függés, ha elírom a címet; akkor is kell a cím, ha csak új árut akarok felvenni)

**Megoldás:** Inkább tároljuk két táblában:

Példa: TERMELŐ(TNÉV,TERMÉK,ÁR,CÍM)

- TNÉV → CÍM
- TNÉV, TERMÉK → ÁR

**Gond:** TERMELŐ címét minden terméknél tároljuk

⇒ redundancia + veszélyek : cím mindig kell, minden módosításhoz; könnyen sérülhet a fent megadott függés, ha elírom a címet; akkor is kell a cím, ha csak új árut akarok felvenni)

**Megoldás:** Inkább tároljuk két táblában:

$R = \pi_{\text{TNÉV, CÍM}}(\text{TERMELŐ})$  és

$S = \pi_{\text{TNÉV, TERMÉK, ÁR}}(\text{TERMELŐ})$

Példa: TERMELŐ(TNÉV,TERMÉK,ÁR,CÍM)

- TNÉV → CÍM
- TNÉV, TERMÉK → ÁR

**Gond:** TERMELŐ címét minden terméknél tároljuk

⇒ redundancia + veszélyek : cím mindig kell, minden módosításhoz; könnyen sérülhet a fent megadott függés, ha elírom a címet; akkor is kell a cím, ha csak új árut akarok felvenni)

**Megoldás:** Inkább tároljuk két táblában:

$R = \pi_{\text{TNÉV, CÍM}}(\text{TERMELŐ})$  és

$S = \pi_{\text{TNÉV, TERMÉK, ÁR}}(\text{TERMELŐ})$

⇒  $\text{TERMELŐ} = R \bowtie S$  (ha kell egyben a tábla, vissza lehet állítani)

Jó-e bármilyen felbontás?

Jó-e bármilyen felbontás?

$R' = \pi_{\text{TNÉV, CÍM, ÁR}}(\text{TERMELŐ})$  és

$S' = \pi_{\text{TNÉV, TERMÉK}}(\text{TERMELŐ})$

Jó-e bármilyen felbontás?

$R' = \pi_{\text{TNÉV, CÍM, ÁR}}(\text{TERMELŐ})$  és

$S' = \pi_{\text{TNÉV, TERMÉK}}(\text{TERMELŐ})$

$\Rightarrow$  minden terméknek ugyanannyi lesz az ára (sok ára lesz)

$\Rightarrow \text{TERMELŐ} \not\subseteq R' \bowtie S'$

## Jó-e bármilyen felbontás?

$R' = \pi_{\text{TNÉV, CÍM, ÁR}}(\text{TERMELŐ})$  és

$S' = \pi_{\text{TNÉV, TERMÉK}}(\text{TERMELŐ})$

$\Rightarrow$  minden terméknek ugyanannyi lesz az ára (sok ára lesz)

$\Rightarrow \text{TERMELŐ} \not\subseteq R' \bowtie S'$

Az lesz majd a kérdés, hogy mik lesznek a jó felbontások?



## Származtatott műveletek

### Bal (jobb) félillesztés

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S = R$  azon sorai, amelyhez vannak passzoló sorok  $S$ -ben

## Származtatott műveletek

### Bal (jobb) félillesztés

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie S = R$  azon sorai, amelyhez vannak passzoló sorok  $S$ -ben  
 $R \bowtie S = \pi_R(R \bowtie S)$
- $R \bowtie S \subseteq R$
- $R \bowtie S =$  ugyanez jobbról
- 

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$a$	$4$

$S$	$D$	$C$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

## Származtatott műveletek

### Bal (jobb) félillesztés

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\implies R \bowtie S = R$  azon sorai, amelyhez vannak passzoló sorok  $S$ -ben  
 $R \bowtie S = \pi_R(R \bowtie S)$
- $R \bowtie S \subseteq R$
- $R \bowtie S =$  ugyanez jobbról
- 

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$a$	$4$

$S$	$D$	$C$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

$R \bowtie S$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$

## Származtatott műveletek

### Bal (jobb) félillesztés

- $R(A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_r), S(A_1, \dots, A_k, C_1, \dots, C_s)$  relációk  
 $\implies R \bowtie S = R$  azon sorai, amelyhez vannak passzoló sorok  $S$ -ben  
 $R \bowtie S = \pi_R(R \bowtie S)$
- $R \bowtie S \subseteq R$
- $R \bowtie S =$  ugyanez jobbról
- 

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$a$	$4$

$S$	$D$	$C$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

$R \bowtie S$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$

$R \bowtie S$	$D$	$C$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

## Származtatott műveletek

### $\theta$ -illesztés

- $R, S$  relációk  
 $\Rightarrow R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = R \times S$  azon sorai, amelyben az adott oszlopok  $\theta$  relációban vannak

## Származtatott műveletek

### $\theta$ -illesztés

- $R, S$  relációk

$\Rightarrow R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = R \times S$  azon sorai, amelyben az adott oszlopok  $\theta$  relációban vannak

$$R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = \sigma_{R.A_i \theta S.B_j}(R \times S)$$

## Származtatott műveletek

### $\theta$ -illesztés

- $R, S$  relációk

$\Rightarrow R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = R \times S$  azon sorai, amelyben az adott oszlopok  $\theta$  relációban vannak

$$R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = \sigma_{R.A_i \theta S.B_j}(R \times S)$$

- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$a$	$4$

$S$	$D$	$E$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

## Származtatott műveletek

### $\theta$ -illesztés

- $R, S$  relációk

$\Rightarrow R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = R \times S$  azon sorai, amelyben az adott oszlopok  $\theta$  relációban vannak

$$R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = \sigma_{R.A_i \theta S.B_j}(R \times S)$$

- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$a$	$4$

$S$	$D$	$E$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

$R \bowtie_{C \leq E} S$	$A$	$B$	$C$	$D$	$E$
	$a$	$b$	$2$	$a$	$2$
	$a$	$b$	$2$	$b$	$3$
	$a$	$b$	$2$	$x$	$2$
	$a$	$c$	$3$	$b$	$3$



## Származtatott műveletek

### $\theta$ -illesztés

- $R, S$  relációk

$\Rightarrow R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = R \times S$  azon sorai, amelyben az adott oszlopok  $\theta$  relációban vannak

$$R \bowtie_{R.A_i \theta S.B_j} S = \sigma_{R.A_i \theta S.B_j}(R \times S)$$

- Példa:

$R$	$A$	$B$	$C$
	$a$	$b$	$2$
	$a$	$c$	$3$
	$b$	$a$	$4$

$S$	$D$	$E$
	$a$	$2$
	$b$	$3$
	$x$	$2$

$R \bowtie_{C \leq E} S$	$A$	$B$	$C$	$D$	$E$
	$a$	$b$	$2$	$a$	$2$
	$a$	$b$	$2$	$b$	$3$
	$a$	$b$	$2$	$x$	$2$
	$a$	$c$	$3$	$b$	$3$