

Adatbázisok elmélete 14. előadás

Katona Gyula Y.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számítástudományi Tsz.

I. B. 137/b

`kiskat@cs.bme.hu`

`http://www.cs.bme.hu/~kiskat`

2005

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Definíció (Boyce–Codd normálforma). Az (R, F) relációs séma BCNF-ben van, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén X superkulcs.

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Definíció (Boyce–Codd normálforma). Az (R, F) relációs séma BCNF-ben van, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén X superkulcs.

Azaz csak olyan függések vannak, hogy a superkulcs mindent meghatároz.

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Definíció (Boyce–Codd normálforma). Az (R, F) relációs séma BCNF-ben van, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén X superkulcs.

Azaz csak olyan függések vannak, hogy a superkulcs mindent meghatároz.

Tétel. Az (R, F) BCNF-ben van pontosan akkor ha tetszőleges $A \in R$ -re és $X \subseteq R$ kulcsra igaz, hogy nincs olyan $Y \subseteq R$, amire $X \rightarrow Y \in F^+$; $Y \twoheadrightarrow X$; $Y \rightarrow A \in F^+$ és $A \notin Y$.

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Definíció (Boyce–Codd normálforma). Az (R, F) relációs séma BCNF-ben van, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén X superkulcs.

Azaz csak olyan függések vannak, hogy a superkulcs mindent meghatároz.

Tétel. Az (R, F) BCNF-ben van pontosan akkor ha tetszőleges $A \in R$ -re és $X \subseteq R$ kulcsra igaz, hogy nincs olyan $Y \subseteq R$, amire $X \rightarrow Y \in F^+$; $Y \twoheadrightarrow X$; $Y \rightarrow A \in F^+$ és $A \notin Y$. (Nincs tranzitív függés kulcstól.)

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Definíció (Boyce–Codd normálforma). Az (R, F) relációs séma BCNF-ben van, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén X superkulcs.

Azaz csak olyan függések vannak, hogy a superkulcs mindent meghatároz.

Tétel. Az (R, F) BCNF-ben van pontosan akkor ha tetszőleges $A \in R$ -re és $X \subseteq R$ kulcsra igaz, hogy nincs olyan $Y \subseteq R$, amire $X \rightarrow Y \in F^+$; $Y \not\rightarrow X$; $Y \rightarrow A \in F^+$ és $A \notin Y$. (Nincs tranzitív függés kulcstól.)

Bizonyítás: Ha nincs BCNF-ben a séma, akkor van egy $Y \rightarrow A$ függés, ahol Y nem superkulcs és $A \notin Y$. Ekkor, tetszőleges X kulccsal: $X \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X, Y \rightarrow A$, de $A \notin Y$, ami épp egy kulcstól való tranzitív függés.

Normálformák

Definíció. Egy $X \rightarrow Y$ függés triviális, ha $Y \subseteq X$. (Mert ezek a függések nem hordoznak sok infót, mindig igazak.)

Definíció (Boyce–Codd normálforma). Az (R, F) relációs séma BCNF-ben van, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén X superkulcs.

Azaz csak olyan függések vannak, hogy a superkulcs mindent meghatároz.

Tétel. Az (R, F) BCNF-ben van pontosan akkor ha tetszőleges $A \in R$ -re és $X \subseteq R$ kulcsra igaz, hogy nincs olyan $Y \subseteq R$, amire $X \rightarrow Y \in F^+$; $Y \not\rightarrow X$; $Y \rightarrow A \in F^+$ és $A \notin Y$. (Nincs tranzitív függés kulcstól.)

Bizonyítás: Ha nincs BCNF-ben a séma, akkor van egy $Y \rightarrow A$ függés, ahol Y nem superkulcs és $A \notin Y$. Ekkor, tetszőleges X kulccsal: $X \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X, Y \rightarrow A$, de $A \notin Y$, ami épp egy kulcstól való tranzitív függés.

Másrészt, ha van tranzitív függés kulcstól, azaz X olyan kulcs, amivel $X \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X, Y \rightarrow A$, de $A \notin Y$, akkor $Y \rightarrow A$ egy olyan függés, ami sérti a BCNF tulajdonságot, mert Y nem lehet superkulcs, ha $Y \not\rightarrow X$. ✓

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \Rightarrow A$ kulcs.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.
 $\implies B \in U^+(F)$

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \Rightarrow A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \Rightarrow B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.
 $\Rightarrow B \in U^+(F) \Rightarrow U \subsetneq U^+(F)$

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \Rightarrow A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \Rightarrow B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.
 $\Rightarrow B \in U^+(F) \Rightarrow U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.

$\implies B \in U^+(F) \implies U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni $\implies \exists V \rightarrow W \in F$, melyre $V \subseteq U$, $W \notin U$

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.
 $\implies B \in U^+(F) \implies U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni $\implies \exists V \rightarrow W \in F$, melyre $V \subseteq U$, $W \notin U$
 $\implies V \rightarrow W$ jó lesz $X \rightarrow Y$ -nak.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \Rightarrow A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \Rightarrow B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.

$\Rightarrow B \in U^+(F) \Rightarrow U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni $\Rightarrow \exists V \rightarrow W \in F$, melyre $V \subseteq U$, $W \notin U$

$\Rightarrow V \rightarrow W$ jó lesz $X \rightarrow Y$ -nak.

Ugyanis V nem superkulcs, hiszen $V \subseteq U$ és U nem superkulcs.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \Rightarrow A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \Rightarrow B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.

$\Rightarrow B \in U^+(F) \Rightarrow U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni $\Rightarrow \exists V \rightarrow W \in F$, melyre $V \subseteq U$, $W \notin U$

$\Rightarrow V \rightarrow W$ jó lesz $X \rightarrow Y$ -nak.

Ugyanis V nem superkulcs, hiszen $V \subseteq U$ és U nem superkulcs.

$W \notin U$

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \Rightarrow **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \Rightarrow A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \Rightarrow B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.
 $\Rightarrow B \in U^+(F) \Rightarrow U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni $\Rightarrow \exists V \rightarrow W \in F$, melyre $V \subseteq U$, $W \notin U$
 $\Rightarrow V \rightarrow W$ jó lesz $X \rightarrow Y$ -nak.

Ugyanis V nem superkulcs, hiszen $V \subseteq U$ és U nem superkulcs.

$W \notin U \Rightarrow \exists A \in W \setminus U \subseteq W \setminus V$, így $V \rightarrow W$ nem triviális.

Miért jó a BCNF séma?

Ha $C \rightarrow B$; $B \rightarrow A$ teljesülne, de $B \rightarrow C$ nem, akkor ugyanaz a B érték több C érték mellett is előfordulhatna, de minden példánynál ugyanazt az A értéket is tároljuk \implies **redundancia**.

Állítás. ≤ 2 attribútumos reláció mindig BCNF.

Bizonyítás: Ha $A \rightarrow B \implies A$ kulcs. Ha $B \rightarrow A \implies B$ kulcs.

Mivel F^+ -ra követeljük meg a feltételt, nehéz ellenőrizni.

DE:

Tétel. Ha (R, F) nem BCNF, akkor van olyan $X \rightarrow Y \in F$, amely jobboldalának valamely A attribútumára $X \rightarrow A$ nemtriviális és X nem superkulcs. (Az ilyen $X \rightarrow A \in F^+$.)

Bizonyítás: Ha (R, F) nem BCNF, akkor van $U \rightarrow B \in F^+$, hogy U nem superkulcs és $B \notin U$.
 $\implies B \in U^+(F) \implies U \subsetneq U^+(F)$

Az algoritmus, ami $U^+(F)$ -et számolja, el tud indulni $\implies \exists V \rightarrow W \in F$, melyre $V \subseteq U$, $W \notin U$
 $\implies V \rightarrow W$ jó lesz $X \rightarrow Y$ -nak.

Ugyanis V nem superkulcs, hiszen $V \subseteq U$ és U nem superkulcs.

$W \notin U \implies \exists A \in W \setminus U \subseteq W \setminus V$, így $V \rightarrow W$ nem triviális.

Ez jelentősen könnyíti az ellenőrzést, csak F függőségeit kell végignézni, nem F^+ -ét.

Normalizálás

Tétel. *Tetszőleges (R, F) sémának van hűséges felbontása BCNF relációkra.*

Normalizálás

Tétel. *Tetszőleges (R, F) sémának van hűséges felbontása BCNF relációkra.*

Bizonyítás: Elve:

- Ha (R, F) BCNF ✓

Normalizálás

Tétel. *Tetszőleges (R, F) sémának van hűséges felbontása BCNF relációkra.*

Bizonyítás: Elve:

- Ha (R, F) BCNF ✓
- Ha nem, akkor két valódi (kisebb) részre bontjuk hűségesen $\implies (R_1, R_2)$

Normalizálás

Tétel. *Tetszőleges (R, F) sémának van hűséges felbontása BCNF relációkra.*

Bizonyítás: Elve:

- Ha (R, F) BCNF ✓
- Ha nem, akkor két valódi (kisebb) részre bontjuk hűségesen $\implies (R_1, R_2)$
- Ezt ismételjük (R_1, R_2) -re.

Normalizálás

Tétel. *Tetszőleges (R, F) sémának van hűségese felbontása BCNF relációkra.*

Bizonyítás: Elve:

- Ha (R, F) BCNF ✓
- Ha nem, akkor két valódi (kisebb) részre bontjuk hűségesen $\implies (R_1, R_2)$
- Ezt ismételjük (R_1, R_2) -re.

Ez véget fog érni, mert ha már csak 2 attribútum marad valamelyikben, azt nem kell tovább bontani.

Normalizálás

Tétel. *Tetszőleges (R, F) sémának van hűséges felbontása BCNF relációkra.*

Bizonyítás: Elve:

- Ha (R, F) BCNF ✓
- Ha nem, akkor két valódi (kisebb) részre bontjuk hűségesen $\implies (R_1, R_2)$
- Ezt ismételjük (R_1, R_2) -re.

Ez véget fog érni, mert ha már csak 2 attribútum marad valamelyikben, azt nem kell tovább bontani.

Hűséges lesz, mert láttuk, hogy ha egy hűséges felbontás egyik részét tovább bontjuk, akkor hűséges marad.

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot

$\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem szuperkulcs

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot

$\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem superkulcs

$$R_1 := XA, \quad R_2 := R \setminus \{A\}$$

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot
 $\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem superkulcs

$$R_1 := XA, \quad R_2 := R \setminus \{A\}$$

Ezek kisebbek: R_2 nyilván, R_1 pedig azért, mert ha $R_1 = R$ volna, akkor $X \rightarrow XA = R$ miatt X superkulcs lett volna.

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot
 $\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem superkulcs

$$R_1 := XA, \quad R_2 := R \setminus \{A\}$$

Ezek kisebbek: R_2 nyilván, R_1 pedig azért, mert ha $R_1 = R$ volna, akkor $X \rightarrow XA = R$ miatt X superkulcs lett volna.

Hűséges a felbontás: kétrészes teszttel $R_1 \cap R_2 = X \rightarrow A = R_1 \setminus R_2$ ✓

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot
 $\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem superkulcs

$$R_1 := XA, \quad R_2 := R \setminus \{A\}$$

Ezek kisebbek: R_2 nyilván, R_1 pedig azért, mert ha $R_1 = R$ volna, akkor $X \rightarrow XA = R$ miatt X superkulcs lett volna.

Hűséges a felbontás: kétrészes teszttel $R_1 \cap R_2 = X \rightarrow A = R_1 \setminus R_2$ ✓

Miért lesz jobb ez a felbontás?

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot
 $\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem superkulcs

$$R_1 := XA, \quad R_2 := R \setminus \{A\}$$

Ezek kisebbek: R_2 nyilván, R_1 pedig azért, mert ha $R_1 = R$ volna, akkor $X \rightarrow XA = R$ miatt X superkulcs lett volna.

Hűséges a felbontás: kétrészes tesztel $R_1 \cap R_2 = X \rightarrow A = R_1 \setminus R_2$ ✓

Miért lesz jobb ez a felbontás?

Az $X \rightarrow A$ függéssel nem lesz több probléma:

Bizonyítás

Hogyan bontjuk fel 2 valódi részre, hűségesen?

Keresünk a felbontandó sémában egy olyan $X \rightarrow A \in F^+$ -t, ami sérti a BCNF tulajdonságot
 $\Rightarrow A$ és X része a sémának, $A \notin X$ és X nem superkulcs

$$R_1 := XA, \quad R_2 := R \setminus \{A\}$$

Ezek kisebbek: R_2 nyilván, R_1 pedig azért, mert ha $R_1 = R$ volna, akkor $X \rightarrow XA = R$ miatt X superkulcs lett volna.

Hűséges a felbontás: kétrészes tesztel $R_1 \cap R_2 = X \rightarrow A = R_1 \setminus R_2$ ✓


Miért lesz jobb ez a felbontás?

Az $X \rightarrow A$ függéssel nem lesz több probléma: R_2 -ben nincs A , így nem lehet baj. R_1 -ben viszont X superkulcs lesz.

Példa

$R(\text{Tanár, Tárgy, Terem, Diák, Jegy, Idő})$


$F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\} \Rightarrow \text{kulcs csak ID}$



Példa

$R(\text{Tanár, Tárgy, Terem, Diák, Jegy, Idő})$


$F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\} \Rightarrow$ kulcs csak ID



Példa

$R(\text{Tanár, Tárgy, Terem, Diák, Jegy, Idő})$

$F = \{\text{Tá} \rightarrow \text{T}; \text{IT} \rightarrow \text{Te}; \text{ID} \rightarrow \text{Te}; \text{ID} \rightarrow \text{Tá}; \text{TáD} \rightarrow \text{J}\} \Rightarrow$ kulcs csak ID



Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Pl.: $F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\}$

Ha $S = Tá Te D I$, akkor (csak a nemtrivi függéseket felírva):

$F_S^+ = \{Tá I \rightarrow Te; D I \rightarrow Te Tá; D I Tá \rightarrow Te; D I Te \rightarrow Tá\}$

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Pl.: $F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\}$

Ha $S = Tá Te D I$, akkor (csak a nemtrivi függéseket felírva):

$F_S^+ = \{Tá I \rightarrow Te; D I \rightarrow Te Tá; D I Tá \rightarrow Te; D I Te \rightarrow Tá\}$

\Rightarrow Az előző algoritmus lehet exponenciális

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Pl.: $F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\}$

Ha $S = Tá Te D I$, akkor (csak a nemtrivi függéseket felírva):

$F_S^+ = \{Tá I \rightarrow Te; D I \rightarrow Te Tá; D I Tá \rightarrow Te; D I Te \rightarrow Tá\}$

\Rightarrow Az előző algoritmus lehet exponenciális \Rightarrow Van polinomiális algoritmus is.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Pl.: $F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\}$

Ha $S = Tá Te D I$, akkor (csak a nemtrivi függéseket felírva):

$F_S^+ = \{Tá I \rightarrow Te; D I \rightarrow Te Tá; D I Tá \rightarrow Te; D I Te \rightarrow Tá\}$

\Rightarrow Az előző algoritmus lehet exponenciális \Rightarrow Van polinomiális algoritmus is.

3 attribútum esetén a BCNF tulajdonság csak úgy sérülhet, ha $X \rightarrow Y$, ahol X, Y egy-egy attribútum és X nem kulcs.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Pl.: $F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\}$

Ha $S = Tá Te D I$, akkor (csak a nemtrivi függéseket felírva):

$F_S^+ = \{Tá I \rightarrow Te; D I \rightarrow Te Tá; D I Tá \rightarrow Te; D I Te \rightarrow Tá\}$

\Rightarrow Az előző algoritmus lehet exponenciális \Rightarrow Van polinomiális algoritmus is.

3 attribútum esetén a BCNF tulajdonság csak úgy sérülhet, ha $X \rightarrow Y$, ahol X, Y egy-egy attribútum és X nem kulcs.

Azt is mindig ellenőrizni kell, hogy a kapott relációkban mik a (szuper)kulcsok, hogy egy függésről el tudjuk dönteni, hogy sérti-e a BCNF-et vagy nem.

Megjegyzések

Minden felbontás után meg kell nézni, hogy a kapott relációk BCNF-ben vannak-e. Ehhez meg kell konstruálni F_S^+ -et, ha S a vizsgált reláció: ez az F_R^+ azon függéseiből áll, amiknek mindkét oldala S -ben van. Ezeket a függéseket úgy kapjuk, hogy minden $X \subseteq S$ részhalmazra kiszámoljuk $X^+(F)$ -et és $X \rightarrow Y$ pontosan akkor lesz benne F_S^+ -ben, ha $Y \subseteq X^+(F) \cap S$.

Általában nem igaz, hogy elég F -ből kiválogatni azokat, amiknek mindkét oldala S -ben van.

Pl.: $F = \{Tá \rightarrow T; IT \rightarrow Te; ID \rightarrow Te; ID \rightarrow Tá; TáD \rightarrow J\}$

Ha $S = Tá Te D I$, akkor (csak a nemtrivi függéseket felírva):

$F_S^+ = \{Tá I \rightarrow Te; D I \rightarrow Te Tá; D I Tá \rightarrow Te; D I Te \rightarrow Tá\}$

\Rightarrow Az előző algoritmus lehet exponenciális \Rightarrow Van polinomiális algoritmus is.

3 attribútum esetén a BCNF tulajdonság csak úgy sérülhet, ha $X \rightarrow Y$, ahol X, Y egy-egy attribútum és X nem kulcs.

Azt is mindig ellenőrizni kell, hogy a kapott relációkban mik a (szuper)kulcsok, hogy egy függésről el tudjuk dönteni, hogy sérti-e a BCNF-et vagy nem. A példában ez viszonylag könnyű lesz, hiszen I és D egyik F -beli függőségben sem szerepel a jobb oldalon, így minden kulcs (amikor I és D szerepel a relációban) tartalmazza $I D$ -t.

Csak azt kell megnézni, hogy $I D$ kulcs marad.

Függőség megőrzése

BCNF egy fogyatékosága: nehéz lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e F függései (pl. beszúráskor). Ilyenkor a költséges \bowtie kell, és ez sokszor előfordulhat.

Függőség megőrzése

BCNF egy fogyatékosága: nehéz lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e F függései (pl. beszúrásakor). Ilyenkor a költséges \bowtie kell, és ez sokszor előfordulhat.

Kéne egy olyan felbontás, amin könnyen lehet ellenőrizni a függéseket.

Függőség megőrzése

BCNF egy fogyatékosága: nehéz lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e F függései (pl. beszúráskor). Ilyenkor a költséges \bowtie kell, és ez sokszor előfordulhat.

Kéne egy olyan felbontás, amin könnyen lehet ellenőrizni a függéseket.

Definíció. Adott (R, F) séma és ennek egy $\rho = (R_1, \dots, R_k)$ felbontása.

$$\pi_\rho(F) := \{X \rightarrow Y \in F^+ \mid \exists i (1 \leq i \leq k) X, Y \subseteq R_i\}^+$$

az F függéseinek vetítése a ρ felbontásra.

Függőség megőrzése

BCNF egy fogyatékosága: nehéz lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e F függései (pl. beszúrásakor). Ilyenkor a költséges \bowtie kell, és ez sokszor előfordulhat.

Kéne egy olyan felbontás, amin könnyen lehet ellenőrizni a függéseket.

Definíció. Adott (R, F) séma és ennek egy $\rho = (R_1, \dots, R_k)$ felbontása.

$$\pi_\rho(F) := \{X \rightarrow Y \in F^+ \mid \exists i (1 \leq i \leq k) X, Y \subseteq R_i\}^+$$

az F függéseinek vetítése a ρ felbontásra. ρ függőségőrző, ha $\pi_\rho(F) = F^+$.

Függőség megőrzése

BCNF egy fogyatékosága: nehéz lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e F függései (pl. beszúráskor). Ilyenkor a költséges \bowtie kell, és ez sokszor előfordulhat.

Kéne egy olyan felbontás, amin könnyen lehet ellenőrizni a függéseket.

Definíció. Adott (R, F) séma és ennek egy $\rho = (R_1, \dots, R_k)$ felbontása.

$$\pi_\rho(F) := \{X \rightarrow Y \in F^+ \mid \exists i (1 \leq i \leq k) X, Y \subseteq R_i\}^+$$

az F függéseinek vetítése a ρ felbontásra. ρ függőségőrző, ha $\pi_\rho(F) = F^+$.

Megjegyzés: $\pi_\rho(F) \subseteq F^+$ persze mindig igaz.

Függőség megőrzése

BCNF egy fogyatékosága: nehéz lehet ellenőrizni, hogy teljesülnek-e F függései (pl. beszúráskor). Ilyenkor a költséges \bowtie kell, és ez sokszor előfordulhat.

Kéne egy olyan felbontás, amin könnyen lehet ellenőrizni a függéseket.

Definíció. Adott (R, F) séma és ennek egy $\rho = (R_1, \dots, R_k)$ felbontása.

$$\pi_\rho(F) := \{X \rightarrow Y \in F^+ \mid \exists i (1 \leq i \leq k) X, Y \subseteq R_i\}^+$$

az F függéseinek vetítése a ρ felbontásra. ρ függőségőrző, ha $\pi_\rho(F) = F^+$.

Megjegyzés: $\pi_\rho(F) \subseteq F^+$ persze mindig igaz.

Ha a felbontás függőségőrző, akkor elég a darabokon ellenőrizni valamit, ami garantálja, hogy F minden függése fennmarad az egészen.

Példa

$R(\mathbf{Város}, \mathbf{Utca}, \mathbf{Irányítószám}) \quad F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$

Példa

$R(\mathbf{Város}, \mathbf{Utca}, \mathbf{Irányítószám})$

Ez nem BCNF $I \rightarrow V$ miatt.

$$F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$$

Példa

$R(\text{Város, Utca, Irányítószám}) \quad F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$

Ez nem BCNF $I \rightarrow V$ miatt.

Mire jó a függőségőrzés?:

Ha felbontjuk $\Rightarrow S(V, I), Q(I, U)$

Példa

$R(\mathbf{Város, Utca, Irányítószám}) \quad F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$

Ez nem BCNF $I \rightarrow V$ miatt.

Mire jó a függőségőrzés?:

Ha felbontjuk $\Rightarrow S(V, I), Q(I, U)$

Beszúrunk 2-2 sort:

S	V	I
	Nagykanizsa	8800
	Nagykanizsa	8831

Q	U	I
	Kossuth	8800
	Kossuth	8831

Példa

$R(\mathbf{Város, Utca, Irányítószám}) \quad F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$

Ez nem BCNF $I \rightarrow V$ miatt.

Mire jó a függőségőrzés?:

Ha felbontjuk $\Rightarrow S(V, I), Q(I, U)$

Beszúrunk 2-2 sort:

S	V	I
	Nagykanizsa	8800
	Nagykanizsa	8831

Q	U	I
	Kossuth	8800
	Kossuth	8831

Noha S -ben és Q -ban oké minden, $S \bowtie Q$ -ban nem teljesül a $VU \rightarrow I$ függés.

Példa

$R(\text{Város, Utca, Irányítószám}) \quad F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$

Ez nem BCNF $I \rightarrow V$ miatt.

Mire jó a függőségőrzés?:

Ha felbontjuk $\Rightarrow S(V, I), Q(I, U)$

Beszúrunk 2-2 sort:

S	V	I
	Nagykanizsa	8800
	Nagykanizsa	8831

Q	U	I
	Kossuth	8800
	Kossuth	8831

Noha S -ben és Q -ban oké minden, $S \bowtie Q$ -ban nem teljesül a $VU \rightarrow I$ függés.

Ez nem lett volna, ha függőségőrző lenne a felbontás.

Szomorú példa ez: semelyik felbontása sem őrzi meg $VU \rightarrow I$ -t, mert csak ez olyan függés, aminek jobb oldalán van I , azaz ha egy felbontás függőségőrző lenne, akkor egy tagjában kéne VUI -nek lennie, de az nem lenne valódi felbontás.

Példa

$R(\text{Város, Utca, Irányítószám}) \quad F = \{VU \rightarrow I; I \rightarrow V\}$

Ez nem BCNF $I \rightarrow V$ miatt.

Mire jó a függőségőrzés?:

Ha felbontjuk $\Rightarrow S(V, I), Q(I, U)$

Beszúrunk 2-2 sort:

S	V	I
	Nagykanizsa	8800
	Nagykanizsa	8831

Q	U	I
	Kossuth	8800
	Kossuth	8831

Noha S -ben és Q -ban oké minden, $S \bowtie Q$ -ban nem teljesül a $VU \rightarrow I$ függés.

Ez nem lett volna, ha függőségőrző lenne a felbontás.

Szomorú példa ez: semelyik felbontása sem őrzi meg $VU \rightarrow I$ -t, mert csak ez olyan függés, aminek jobb oldalán van I , azaz ha egy felbontás függőségőrző lenne, akkor egy tagjában kéne VUI -nek lennie, de az nem lenne valódi felbontás.

\Rightarrow ennek nincs függőségőrző valódi felbontása, vagyis van olyan reláció, amit nem lehet függőségőrző módon BCNF-ekre szétszedni

Következmény

Állítás. *Felbontás BCNF-be nem feltétlenül függőségőrző.*

Következmény

Állítás. *Felbontás BCNF-be nem feltétlenül függőségőrző.*

Kellene egy gyengébb normálforma. Ebben lehet valamennyi redundancia, de legyen függőségőrző.

3NF

Definíció. Az (R, F) séma A attribútuma **prím (elsődleges)**, ha szerepel valamelyik kulcsban.

3NF

Definíció. Az (R, F) séma A attribútuma **prím (elsődleges)**, ha szerepel valamelyik kulcsban.

Szuperkulcsban minden szerepel, kulcs helyett szuperkulccsal nem lenne sok értelme az előbbi definíciónak.

3NF

Definíció. Az (R, F) séma A attribútuma **prím (elsődleges)**, ha szerepel valamelyik kulcsban.

Szuperkulcsban minden szerepel, kulcs helyett szuperkulccsal nem lenne sok értelme az előbbi definíciónak.

Definíció. Az (R, F) séma **3NF (harmadik normálformájú)**, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén vagy X szuperkulcs vagy A prímattribútum.

3NF


Definíció. Az (R, F) séma A attribútuma **prím (elsődleges)**, ha szerepel valamelyik kulcsban.

Szuperkulcsban minden szerepel, kulcs helyett szuperkulccsal nem lenne sok értelme az előbbi definíciónak.

Definíció. Az (R, F) séma **3NF (harmadik normálformájú)**, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén vagy X szuperkulcs vagy A prímattribútum.

Következmény. Minden BCNF séma egyben 3NF is.

3NF lehet redundáns, de nem nagyon.



3NF


Definíció. Az (R, F) séma A attribútuma **prím (elsődleges)**, ha szerepel valamelyik kulcsban.

Szuperkulcsban minden szerepel, kulcs helyett szuperkulccsal nem lenne sok értelme az előbbi definíciónak.

Definíció. Az (R, F) séma **3NF (harmadik normálformájú)**, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén vagy X szuperkulcs vagy A prímattribútum.

Következmény. Minden BCNF séma egyben 3NF is.

3NF lehet redundáns, de nem nagyon.



Tétel. Ha (R, F) egy 3NF séma, akkor minden nem prím A attribútumra és $X \subseteq R$ kulcsra igaz, hogy nincs olyan Y , hogy $X \rightarrow Y$, $Y \twoheadrightarrow X$, $Y \rightarrow A$ és $A \notin Y$. (Nem-elsődleges attribútum nem függ tranzitívan kulcstól.)

3NF


Definíció. Az (R, F) séma A attribútuma **prím (elsődleges)**, ha szerepel valamelyik kulcsban.

Szuperkulcsban minden szerepel, kulcs helyett szuperkulccsal nem lenne sok értelme az előbbi definíciónak.

Definíció. Az (R, F) séma **3NF (harmadik normálformájú)**, ha tetszőleges nemtriviális $X \rightarrow A \in F^+$ függés esetén vagy X szuperkulcs vagy A prímattribútum.

Következmény. Minden BCNF séma egyben 3NF is.

3NF lehet redundáns, de nem nagyon.



Tétel. Ha (R, F) egy 3NF séma, akkor minden nem prím A attribútumra és $X \subseteq R$ kulcsra igaz, hogy nincs olyan Y , hogy $X \rightarrow Y$, $Y \twoheadrightarrow X$, $Y \rightarrow A$ és $A \notin Y$. (Nem-elsődleges attribútum nem függ tranzitívan kulcstól.)

Nem bizonyítjuk, úgy menne, mint BCNF-nél a hasonló állítás.