

# Stabil párosítások alkalmazásai

## GRÁFOK ÉS ALGORITMUSOK

### 4. gyakorlat

2025.

#### Tétel.

Legyenek  $M_1, M_2, \dots, M_k$  stabil párosítások egy  $G$  páros gráfban és legyen  $i \in \{1, \dots, k\}$ . Ha minden fiú e párosításokból multiplicitással számítva az  $i$ -edik legjobb élt választja, akkor egy olyan stabil párosítást kapunk, amiben minden lány a  $(k + 1 - i)$ -edik legjobb élt kapja.

#### Pym tétele.

Egy  $D = (V, A)$  digráfban adottak a páronként pontdiszjunkt irányított utakból álló  $\mathcal{P}$  és  $\mathcal{Q}$  halmazok. Ekkor létezik olyan  $\mathcal{R}$  páronként pontdiszjunkt irányított utakból álló halmaz, amelyre

- (1)  $\text{start}(\mathcal{P}) \subseteq \text{start}(\mathcal{R}) \subseteq \text{start}(\mathcal{P}) \cup \text{start}(\mathcal{Q})$ ,
- (2)  $\text{ter}(\mathcal{Q}) \subseteq \text{ter}(\mathcal{R}) \subseteq \text{ter}(\mathcal{P}) \cup \text{ter}(\mathcal{Q})$ ,
- (3) minden  $\mathcal{R}$ -beli út egy  $\mathcal{P}$ -beli út (esetleg üres) kezdőszeletének és egy  $\mathcal{Q}$ -beli út (esetleg üres) végszeletének az egymásutánja,

ahol  $\text{start}(\mathcal{X})$  és  $\text{ter}(\mathcal{X})$  az  $\mathcal{X}$  úthalmaz kezdő-, illetve végpontjainak halmazát jelöli.

#### Definíció.

Legyen  $G = (V, E)$  egy gráf és  $L_e \subseteq \mathbb{N}$  egy színlista minden  $e \in E$  élhez. A  $G$  gráfot  $L$ -élszínezhetőnek nevezzük, ha van olyan helyes élszínezése, ahol minden  $e \in E$  él színe egy  $L_e$ -beli szín.

A  $G$  gráfot  $k$ -él-listaszínezhetőnek nevezzük, ha az  $L$ -élszínezhető minden olyan esetben, amikor  $|L(e)| \geq k$  teljesül minden  $e$  élre.

Azt mondjuk, hogy a  $G$  gráf  $k$ -él-listaszínezési száma  $\chi'_l(G) = k$ , ha  $G$   $k$ -él-listaszínezhető, de nem  $(k - 1)$ -él-listaszínezhető.

#### Megfigyelés.

Tetszőleges  $G$  gráf esetén  $\chi'(G) \leq \chi'_l(G)$ .

#### Listaszínezési sejtés.

Tetszőleges  $G$  véges gráf esetén  $\chi'(G) = \chi'_l(G)$ .


#### Galvin tétele.

Ha  $G$  páros gráf, akkor  $\chi'_l(G) = \Delta(G)$ .

#### Galvin tételének általánosítása.

Legyen  $G = (V, E)$  egy  $k$ -élszínezhető gráf, és legyen minden élhez adott egy olyan legalább  $k$ -hosszú színlista, hogy bármely szín esetén az adott színnel színezhető élek halmaza nem tartalmaz páratlan kört. Ekkor a  $G$  gráf  $k$ -él-listaszínezhető a megadott színlistákról.

1. Tekintsük az alábbi irányított utakat. Jelölje  $\mathcal{P}$  a szaggatott vonallal jelölt utak,  $\mathcal{Q}$  pedig a folytonos vonallal jelölt utak halmazát. Keressük meg a Pym-tételben szereplő  $\mathcal{R}$  halmazt a tétel bizonyítása alapján.



2. Tegyük fel, hogy a  $D$  irányított gráf páronként pontdiszjunkt irányított útjai alkotják a  $\mathcal{P}$  és  $\mathcal{Q}$  úthalmazokat. Igazoljuk, hogy található  $D$  csúcsainak olyan  $U$  részhalmaza, amelyre igaz, hogy  $\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$  egyetlen útja sem tartalmaz két  $U$ -beli csúcsot, továbbá  $D$  minden  $U$ -n kívüli  $v$  csúcsához létezik olyan  $u \in U$  csúcs és  $\mathcal{P} \cup \mathcal{Q}$ -beli  $P$  út, amelyen  $u$  megelőzi  $v$ -t.
3. Határozzuk meg tetszőleges  $n \geq 3$  esetén az  $n$ -hosszú kör él-listaszínezési számát.
4. Határozzuk meg az alábbi páros gráf egy él-listaszínezését az alábbi színlistákról Galvin tételének bizonyítása alapján. (A listákban szereplő színek: piros, kék, zöld, sárga, lila, narancssárga, barna.)

	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$
$f_1$	–	–	{P,K,Z,B}	–	{P,K,Z,N}
$f_2$	{P,K,Z,N}	–	{Z,S,L,B}	{P,S,N,B}	–
$f_3$	–	{K,S,L,N}	{P,L,N,B}	–	{K,Z,S,B}
$f_4$	{P,K,L,N}	–	{P,S,L,B}	–	–
$f_5$	–	{P,S,N,B}	–	{K,S,L,B}	–

5. Tegyük fel, hogy adott a  $K_{100}$  teljes gráfnak  $\binom{100}{2}$  darab feszítőfája azzal a tulajdonsággal, hogy a gráf bármely élét pontosan 99 feszítőfa tartalmazza. Igazoljuk, hogy kiválasztható minden feszítőfának egy-egy (esetleg üres) párosítása úgy, hogy  $K_{100}$  minden éle szerepeljen valamelyik kiválasztott párosításban.
6. Tegyük fel, hogy a  $G$  páros gráf minden egyes  $e$  éléhez adott egy legalább  $k \cdot \Delta(G)$  színből álló  $L_e$  színlista. Igazoljuk, hogy minden  $e$  élhez választható  $k$  db szín az  $L_e$  színlistából úgy, hogy a közös csúccsal rendelkező élekhez csupa különböző színt válasszunk.
7. Tegyük fel, hogy a  $G$  páros gráf minden egyes  $e$  éléhez adott egy  $k(e)$  pozitív egész érték és egy legalább  $K$  színből álló  $L_e$  színlista, ahol  $K = \max_{v \in V(G)} \sum_{e \in E(v)} k(e)$ . Igazoljuk, hogy minden  $e$  élhez választható  $k(e)$  darab szín az  $L_e$  színlistából úgy, hogy a közös csúccsal rendelkező élekhez csupa különböző színt válasszunk.
8. Az él-listaszínezési számhoz hasonlóan definiálhatjuk a (csúcs-)listaszínezési számot is. Legyen  $G = (V, E)$  egy gráf és  $L_v \subseteq \mathbb{N}$  egy színlista minden  $v \in V$  csúcshoz. A  $G$  gráfot  $L$ -színezhetőnek nevezzük, ha van olyan helyes színezése, ahol minden  $v \in V$  csúcs színe egy  $L_v$ -beli szín. A  $G$  gráfot  $k$ -listaszínezhetőnek nevezzük, ha az  $L$ -színezhető minden olyan esetben, amikor  $|L(v)| \geq k$  teljesül minden  $v$  csúcsra. Azt mondjuk, hogy a  $G$  gráf listaszínezési száma  $\chi_l(G) = k$ , ha  $G$   $k$ -listaszínezhető, de nem  $(k - 1)$ -listaszínezhető.
  - (a) Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges  $G$  gráf esetén  $\chi(G) \leq \chi_l(G) \leq \Delta(G) + 1$  teljesül.
  - (b) Határozzuk meg a  $K_{2,4}$  gráf listaszínezési számát.
  - (c) Legyen  $T$  egy legalább 2-csúcsú fa. Mutassuk meg, hogy  $\chi_l(G) = 2$ .
  - (d) Határozzuk meg tetszőleges  $n \geq 3$  esetén az  $n$ -hosszú kör listaszínezési számát.
9. Tegyük fel, hogy  $M_1, M_2, \dots, M_{2k+1}$  a  $G$  (nem feltétlenül páros) gráf stabil párosításai. Minden, a párosítások által fedett  $v$  csúcsra jelölje  $e(v)$  a  $v$ -re illeszkedő (multiplicitással)  $2k+1$  párosításél közül a  $(k+1)$ -edik legjobbat. Mutassuk meg, hogy az így definiált  $e(v)$  élek halmaza stabil párosítást alkot a  $G$  gráfban.